

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อผลิตสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า The Utilization of Oil Used to Produce a Herbal Foot Deodorant Soap

สุตีรา สนธารักษ์¹

Suteera Suntararak¹

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสบู่ระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันที่ใช้แล้วร่วมกับสารสกัดจากใบมะกรูดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ *Staphylococcus aureus* และ *Micrococcus sedentarius* ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อด้วยวิธี agar diffusion พบร้า สารสกัดน้ำมันของใบมะกรูดด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอล สารสกัดส่วนที่ละลายในเอทานอล คลอร์โฟอร์ม เอทิลอะซิเตทและน้ำสามารถยับยั้งเชื้อ *Staphylococcus aureus* ได้ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคนใส่เท่ากับ 18.50, 8.20, 14.00, 21.30 และ 14.15 มิลลิเมตร ตามลำดับ ในขณะที่เชื้อ *Micrococcus sedentarius* ขนาดของโคนใส่มีค่า 12.60, 8.15, 9.40, 18.20 และ 9.60 มิลลิเมตร ตามลำดับ ดังนั้น จึงนำสารสกัดส่วนที่ละลายในเอทิลอะซิเตทซึ่งมีฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดมาเตรียมสบู่ก้อนที่อัตราส่วนน้ำมันใช้แล้ว : น้ำมันปาล์ม อัตราส่วนเท่ากับ 750 : 250 มิลลิลิตร โดยผสมสารสกัดใบมะกรูดที่ 0, 75, 100 และ 150 มิลลิลิตร ตามลำดับ และทำการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ พบร้า อัตราส่วนต่อสุกต์ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับของ มอก. 29-2545 คือ อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันผลิตสบู่ : สารสกัดใบมะกรูดอัตราส่วนเท่ากับ 1,000 : 75 มิลลิลิตร

WaterMark Sample ABSTRACT

The objective of this research is to develop the herbal foot deodorant soap from used oil containing extracts of bergamot leaves that showed antibacterial activity against *S. aureus* and *M. sedentarius*. Using agar diffusion method. The 95% ethanol crude extract, hexane, chloroform, ethyl acetate and water soluble fractions exhibited antibacterial activity against *S. aureus* with clear zone diameter of 18.50, 8.20, 14.00, 21.30 and 14.15 mm., respectively, and against *M. sedentarius*, with clear zone diameter of 12.60, 8.15, 9.40, 18.20 and 9.60 mm. respectively. Consequently, the ethyl acetate fraction which showed the highest antibacterial activity, was subjected to formulate soap at the ratio of used oil : palm oil = 750 : 250 milliliter by mixed extracts of bergamot leaves of 0, 75, 100 and 150 milliliter respectively. The results show that the lowest ratio between the soap formula and extracts of bergamot leaves that pass TIS.29-2545 standard is 1,000 : 75 milliliter.

Key Words : used oil, foot deodorant, herbal soap

*Corresponding author; e-mail address : tangmay-jaa@hotmail.com

สาขาวิชาภาษาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 31000

¹Department of Environmental Science, Faculty of Science Rajabhat Buriram University 31000

คำนำ

สบู่ผลิตจากกระบวนการการแยกน้ำมันพิเศษ (Saponification) เป็นผลผลิตที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของไขมันกับด่าง มีคุณสมบัติสามารถละลายได้ทั้งในไขมันและน้ำ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย เพื่อชำระล้างคราบสกปรกออกจากผิวนัง ทำให้ร่างกายสะอาดมากขึ้น มีการค้นพบการทำสบู่โดยบังเอิญในยุคโบราณ โดยการนำสัตว์มาบูชายักษ์บนเนินเขาโดยมีการฝ่าและเผาทำให้น้ำมันจากสัตว์ที่เผาผสมกับน้ำที่มาจากน้ำที่มีน้ำตาลตกลงกันสีขาว และเมื่อฝนตกก้อนสีขาวจะหลุดไหลไปตามลำธารทำให้ชาวบ้านนำก้อนสีขาวดังกล่าวมาซักผ้า และสังเกตว่าทำให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้น นับตั้งแต่นั้นมา ก็มีการผลิตสบู่เพื่อนำมาใช้กันมากขึ้น การผลิตสบู่สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม การผลิตสบู่ในทางการค้านิยมใช้สารเคมีสังเคราะห์เพิ่มคุณลักษณะที่ต้องการมากขึ้น เช่น สารแต่งกลิ่นหรือน้ำหอม สารกันเสีย กลิชเชอร์น เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว (จรัญญา, 2544)

ภายในครัวเรือนหรือตามร้านอาหาร น้ำมันพืชหรือสัตว์ถูกใช้ในการประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก และก็ถูกกำจัดทิ้งเป็นจำนวนมาก เช่นกัน โดยทั่วไปจะถูกทิ้งฝานห่อระบายน้ำทำให้แห้งแล้งน้ำในบริเวณชุมชนเกิดการเน่าเสีย เนื่องจากไขมัน เมื่อมีการแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำ ก็จะไม่ยอมอยู่อย่างเดียว ยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเกิดการสะสมและลอยตัวอยู่บริเวณผิวน้ำ ปิดกั้นการถ่ายเทของออกซิเจน และทำลายระบบการย่อยสลายของสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเน่าเสียของแหล่งน้ำตามธรรมชาติในที่สุด (เกรียงศักดิ์, 2542)

จากเหตุผลดังกล่าว ขณะนี้จึงเกิดความสนใจศึกษาเพื่อนำเข้าน้ำมันที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นสบู่ ด้วยเหตุผลที่สำคัญ คือ วัตถุนิบริบทของสบู่ที่เป็นไขมันนั่นเอง (ศรีศักดิ์, 2551) ทั้งนี้มีงานวิจัยของวีไลพร (2554) ซึ่งสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว โดยผลลัพธ์การศึกษาพบว่า น้ำมันที่ใช้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก โดยสามารถนำมาผลิตเป็นสารทำความสะอาด ที่ยั่งยืนและสบู่ชุ่นได้ รวมถึงสมุนไพร (2543) ได้ทำการศึกษาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อผลิตครีมล้างจาน พบว่า มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรกได้ในเกณฑ์ที่ดี ละลายน้ำและล้างออกง่าย อีกทั้งยังมีปริมาณฟองมาก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในห้องตลาด เมื่อทดสอบทางประสิทธิภาพสัมผัส ดังนั้นการนำน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อมาผลิตเป็นสบู่จึงมีความเป็นไปได้ และหากมีการประยุกต์โดยนำมาพัฒนาเป็นสบู่สมุนไพรรังนกกลิ่นเท้าซึ่งเกิดจากการหมักหมมบริเวณเท้าจากเชื้อแบคทีเรียได้ ด้วยการใช้มะกรุด (*Citrus hystrix* DC.) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลอกหลอนหัตถ์ต้านแบคทีเรียที่มีข้อข่ายการออกฤทธิ์กว้าง (Mourey and Canillac, 2002) ดังนั้น ใน การศึกษาครั้นนี้จึงได้ทำการทดสอบสารสกัดหยาบจากใบมะกรุดมาใช้ในการควบคุมการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย *Micrococcus Sedentarius* ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเท้าเหม็น (Pitted Keratolysis) ที่พบมากในเขต้อนได้ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรรังนกกลิ่นเท้าจากน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการจัดการกากของเสีย (waste) อย่างน้ำมันที่ใช้แล้วควบคู่กับการเพิ่มนูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สบู่จากน้ำมันที่ใช้แล้วได้อีกด้วย

ผู้แต่ง
กุลสุรัตน์

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า

ขั้นตอนการทำความสะอาดน้ำมันที่ใช้แล้ว คงจะผู้วิจัยได้นำน้ำมันที่ใช้แล้วซึ่งรวมมาจากร้านขายสูกชั้นยอดภายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาทำความสะอาด ด้วยการกรองผ่านผ้าขาวบางเพื่อนำเอาตะเกอนออก ทำข้าประจำ 2-3 ครั้ง แล้วนำไปต้มพออุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยการใส่ใบเตยและตะไคร้สดอย่างละ 500 กรัมต่อน้ำมันที่ใช้แล้ว 1 ลิตร พักไว้ให้เย็นนำ回去ใบเตยและตะไคร้สดออกแล้วนำไปปั่นมักด้วยน้ำส้มสายชู : น้ำมันที่ใช้แล้ว เท่ากับ 1 : 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นการดับกลิ่นเหม็นที่มี รวมถึงแต่งกลิ่นของน้ำมันที่ใช้แล้ว

การเตรียมสารสกัดหมายจากใบมะกรูด

นำไปบนกระดาษทำความสะอาดและอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาบดเป็นผงหยาบ จากนั้นสกัดต่อเนื่องจนสารละลายใส่โดยวิธีการมักด้วยตัวทำละลาย 95 % เอกานอล (อัตราส่วนระหว่างใบมะกรูด : สารละลาย เท่ากับ 1 : 2) กรองเก็บสารละลายและระเหยออกของออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ความดัน 175 มิลลิบาร์ นำสารสกัดหมายที่ได้มาสกัดแยกส่วนตัวที่ทำละลายแยกเขน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซีเตทและน้ำ ตามลำดับ ทดสอบประสิทธิภาพของส่วนสกัดที่เตรียมได้ในการยับยั้งเชื้อ *Staphylococcus aureus* และ *Micrococcus sedentarius* ด้วยวิธี agar diffusion (Benkebleia (2004); CLSI (2006)) เปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อของส่วนสกัดแต่ละชนิดโดยคูจากค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone (ทดลอง 3 ชั้้า)

ขั้นตอนและวิธีการผลิตสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า

นำสารสกัดส่วนที่มีฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดมาเตรียมสบู่ก้อน โดยขั้นตอนการผลิตสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า เตรียมน้ำด่างผสมหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำได้โดยตวงน้ำ 350 มิลลิลิตร ใส่ลงในชามแก้วแล้วเติมผลึกโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน 32.65 กรัม แล้วปล่อยให้น้ำด่างผสมเย็นลงจนเท่ากับอุณหภูมิห้อง แล้วนำน้ำมันที่ใช้แล้วกับน้ำมันปาล์ม มาผสมกันที่อัตราส่วนน้ำมันที่ใช้แล้ว : น้ำมันปาล์ม เท่ากับ 750 : 250 มิลลิลิตร ตั้งบนเตาไฟให้ได้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จากนั้นค่อยๆ เดินน้ำด่างผสมลงไปในน้ำมันที่ใช้แล้วที่เตรียมไว้ขณะที่เติมน้ำด่างกับการส่วนผสมทั้งหมดด้วยเครื่องผสมสบู่อย่างสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกันจนกว่าส่วนผสมจะขึ้น แล้วทำการผสมสารสกัดใบมะกรูดที่ 0, 75, 100 และ 150 มิลลิลิตรเมตร ตามลำดับ แล้วจึงเทลงในแบบพิมพ์ที่เตรียมโดยการหล่อชิลล์คอนให้มีขนาดและรูปร่างตามที่กำหนด โดยงานวิจัยกำหนดรูปแบบของสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้าเป็นรูปเท้า เพื่อสื่อถึงประโยชน์การใช้งานเฉพาะที่และกระตุ้นความสนใจต่อผู้บริโภค และเมื่อสบู่แข็งตัวดีแล้วประจำ 24 ชั่วโมง จึงนำออกจากแบบพิมพ์

การทดสอบคุณสมบัติของสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้าที่พัฒนาจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

นำสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า มาประเมินลักษณะทางกายภาพ (สี กลิ่น ทดสอบปริมาณฟอง ลักษณะของเนื้อสบู่และการทดสอบอัตราสีกรุ่นของสบู่) คุณภาพทางเคมี (ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)) ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า "การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด" โดยใช้สารละลาย 4% sodium stearate เป็นตัวควบคุม โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลของสบู่ที่เติมสารระงับเชื้อตาม มอก.29-2545 ค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ zone of inhibition ของสบู่ก้อนต้องมีค่ามากกว่าของตัวควบคุมตั้งแต่ 2.0 มิลลิเมตรขึ้นไป (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2545)

การประเมินค่าความพึงพอใจในการยอมรับของผู้บริโภคของสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

ประเมินความพึงพอใจของการยอมรับของผู้บริโภค จำนวน 50 คน ด้วยวิธี Home Use Test โดยใช้ผู้บริโภคที่เป็นอาสาสมัครประเมินความชอบต่อผลิตภัณฑ์สบู่ในด้านสี กลิ่น ความสวยงามและความพึงพอใจ หลังการใช้งาน โดยใช้ 9-Point Hedonic Scale

ผลการทดลอง

การเตรียมสารสกัด helyab จากใบมะกรูด

จากผลการทดลองที่ได้ (Table 1) เมื่อเปรียบเทียบผลของการยับยั้งเชื้อจากค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนไฮโซน (zone of inhibition) ของสารสกัด helyab ในมะกรูด พบว่า ผลการยับยั้งเชื้อ *S. aureus* เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ สวนสกัด เอทิลอะซีเตท > สารสกัด helyab > สวนสกัดน้ำ > คลอโรฟอร์ม > เชกเซน สำหรับผลการยับยั้งเชื้อ *M. sedentarius* เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ สวนสกัด เอทิลอะซีเตท > สารสกัด helyab > สวนสกัดน้ำ > คลอโรฟอร์ม > เชกเซน สวนสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อห้องนอนได้มากที่สุด คือ สวนสกัดด้วยสารละลายเอทิลอะซีเตท โดยมีค่าเท่ากับ 21.30 มิลลิเมตร (*S. aureus*) และ 18.20 มิลลิเมตร (*M. sedentarius*)

Table 1 The antibacterial activities of bergamot leaves extracts.

Extracts	Mean diameter of zone of inhibition (mm.)	
	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Micrococcus sedentarius</i>
Crude extract	18.50ab	12.60ab
Hexane soluble fraction	8.20c	8.15 c
Chloroform soluble fraction	14.00b	9.40b
Ethyl acetate soluble fraction	21.30a	18.20a
Water soluble fraction	14.15b	9.60b

Note : a - c mean within column followed by different letters are significantly different ($p<0.05$)

ทดสอบคุณสมบัติของสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้าที่พัฒนาจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

เมื่อนำสวนสกัดเอทิลอะซีเตทซึ่งมีฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้งเชื้อบคท.ที่เรียน เป็นสบู่ก้อนที่อัตราส่วนน้ำมันที่ใช้แล้ว : น้ำมันปาล์ม อัตราส่วนเท่ากับ 750 : 250 มิลลิลิตร โดยผสมสารสกัดใบมะกรูดที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่า สบู่ก้อนที่มีส่วนผสมของสวนสกัดเอทิลอะซีเตท 75 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งเชื้อ *S. aureus* และเชื้อ *M. sedentarius* ในอัตราส่วนต่ำสุดที่มีน้ำมันเกลนที่การยอมรับของ มาก. 29-2545 (Table 2)

ทั้งนี้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า โดยการประเมินลักษณะทางกายภาพ (สี กลิ่น ทดสอบปริมาณฟอง ลักษณะของเนื้อสบู่และการทดสอบอัตราสีกกร่อนของสบู่) คุณภาพทางเคมี (ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)) แสดงรายละเอียดใน Table 3


ผู้เขียน
รุ่งอรุณ

Table 2 The antibacterial activities of deodorant soaps containing ethyl acetate fraction of bergamot leaves soluble fraction.

The formula of herbal foot deodorant soap bergamot leaves extracts : soap formula (grams)	The different value between diameters of inhibition zone of herbal foot deodorant soap and control (mm.)	
	Staphylococcus aureus	
	Micrococcus sedentarius	
0 : 1,000	< 0c	< 0c
75 : 1,000	5.50a	7.00a
100 : 1,000	10.20b	11.70b
150 : 1,000	12.50b	14.30b

Note : 1) a - c mean within column followed by different letters are significantly different ($p<0.05$)
 2) meet the requirement of TIS.29-2545 (the different value more than 2.00 mm.)
 3) Control soap containing 4% sodium stearate

Table 3 The properties and consumer liking scores of of herbal foot deodorant soap.

The formula of herbal foot deodorant soap bergamot leaves extracts : research soap formula (ml.)	Properties of soap				The average satisfaction			
	pH Values	Flash foam (ml.)	Foam drainage (ml.)	The amount of erosion (%)	Color	Odor	Beatifulness	Performance after use
	8.42c	43.16c	29.7b	2.03a	7.79a	8.20c	6.79c	8.10b
T1 = 0 : 1,000								
	8.15a	43.23b	30.20a	2.32b	7.81a	8.60b	7.10a	8.20a
T2 = 75 : 1,000								
	8.30b	43.26b	27.65c	2.35b	6.79b	8.10c	7.00b	8.00c
T3 = 100 : 1,000								
	8.31b	43.40a	30.86a	2.01a	6.80b	8.80a	6.90b	8.15b
T4 = 150 : 1,000								

Note : 1) research soap formula mean oil used : palm oil = 750 : 250 milliliter

2) a - c mean within column followed by different letters are significantly different ($p<0.05$)

จาก Table 3 จะเห็นได้ว่าสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้าที่พัฒนาจากน้ำมันที่ใช้แล้วมีลักษณะของเนื้อสบู่ที่แข็งไม่มีสิ่งแผลปะ唳 ไม่มีชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตอยู่ และมีค่าความเป็นกรด-ด่างในทุกสูตร การทดลองเป็นด่าง โดยมีค่าระหว่าง 8.15 – 8.42 และปริมาณฟองแบบ Flash foam ระหว่าง 43.16 – 43.40 มิลลิลิตร และแบบ Foam drainage มีค่าระหว่าง 27.65 – 30.86 มิลลิลิตร ส่วนปรอร์เซ็นต์การกัดกร่อนของ ก้อนสบู่ อยู่ระหว่าง 2.10 – 2.35 เปอร์เซ็นต์ และทั้งนี้หากพิจารณาในทุกสูตรทดลองจะเห็นได้ว่าสบู่จากน้ำมันที่ใช้แล้ว เป็นสบู่ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนที่ดี เนื่องจากมีสีและกลิ่นที่น่าใช้ อีกทั้งยังมีความแข็งและ ปริมาณฟองที่พอเหมาะสม สำหรับการประเมินความพึงพอใจในการยอมรับของผู้บริโภค ทำการทดสอบความชอบ ด้วยวิธี 9-point Hedonic Scale พบว่า ในทุกสูตรทดลองมีระดับความพึงพอใจที่ค่อนข้างสูง โดยจะเห็นได้ว่าใน สูตรที่ T 2 ซึ่งเป็นสูตรของสารสกัดใบมะกรูด : น้ำมันใช้แล้ว อัตราส่วนเท่ากับ 75 : 1,000 มิลลิลิตร มีระดับ ความพึงพอใจสูงที่สุดทั้งในด้านสี ความสวยงามและความพึงพอใจหลังการใช้งาน

วิจารณ์

เมื่อเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อจาก ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนไส (zone of inhibition) ของสารสกัดจากใบมะกรูดและส่วนสกัดต่างๆ พบว่า ผลการยับยั้งเชื้อ *S. aureus* เรียงลำดับจากมากไป น้อยได้ดังนี้ ส่วนสกัด ethyl acetate > สารสกัด hairy > ส่วนสกัดน้ำ > คลอโรฟอร์ม > เอกซ์เจน สำหรับผลการ ยับยั้งเชื้อ *M. sedentarius* เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ส่วนสกัด ethyl acetate > สารสกัด hairy > ส่วนสกัดน้ำ > คลอโรฟอร์ม > เอกซ์เจน ส่วนสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อห้องสองชนิดได้มากที่สุด คือ ส่วนสกัด เอทิลอะซีเตท โดยมีค่าเท่ากับ 21.30 มิลลิเมตร (*S. aureus*) และ 18.20 มิลลิเมตร (*M. sedentarius*) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภารวนา (2550) ที่พบว่า มะกรูดคอมแบงแล็บด์ให้เป็นผงผสมกับน้ำก้อน ที่ระดับ ความเข้มข้น 300,000 ppm มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าได้ และงานวิจัยของสุนลรัตน์ (2550) ซึ่งทำการศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากมะกรูดและพืชตระกูลส้ม ด้วยตัวทำละลายเอทิลอะ ซีเตด และวิธีการก้อนด้วยไอโอดีน พบว่า ผิวมะกรูดให้ผลยับยั้ง *S. cerevisiae*

สำหรับอัตราส่วนของการผลิตสบู่จากน้ำมันที่ใช้แล้วต่อน้ำมันปาล์ม พบว่า มีอัตราส่วนคงที่ที่เหมาะสม กันว่าคือ น้ำมันใช้แล้ว : น้ำมันปาล์ม อัตราส่วนเท่ากับ 750 : 250 มิลลิลิตร ทั้งนี้เป็นปริมาณสารสกัดที่เติมลงไปใน สบู่ก้อนที่มีส่วนผสมของส่วนสกัดเอทิลอะซีเตท 75 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งเชื้อ *S. aureus* และเชื้อ *M. sedentarius* ในอัตราส่วนต่ำสุดที่ฝ่านเกณฑ์การยอมรับของ มอก. 29-2545 ได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Ibrahim และคณะ (2012) และงานวิจัยของ Madhavan and Rhama (2011) นำสารที่อยู่ในกลุ่ม flavonoids มาสกัดด้วย ethyl acetate และเตรียมเป็นสบู่ก้อนโดยผสมกับ soap chip ในอัตราส่วนต่างๆ พบว่า สบู่ก้อนที่มีส่วนผสมของส่วนสกัด ethyl acetate ตั้งแต่ร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก สามารถยับยั้งเชื้อ *S. aureus* และ ฝ่านตามเกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพรวม มอก.29-2545

สรุป

สารสกัดจากใบมะกรูดที่สกัดด้วยตัวทำละลายเอทิลอะซิตेट ในผลในการยับยั้งเชื้อ *S. aureus* และเชื้อ *M. sedentarius* ได้สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนสกัดจากตัวทำละลายชนิดอื่น และเมื่อนำไปผสมกับสบู่ที่ผลิตขึ้นจากน้ำมันที่ใช้แล้วในงานวิจัย ในอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดที่ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้คือ สารสกัดใบมะกรูด : สบู่ที่ผลิตจากน้ำมัน อัตราส่วนเท่ากับ 75 : 1,000 มิลลิลิตร กล่าวได้ว่า สบู่ที่ผลิตขึ้นจากน้ำมันที่ใช้แล้ว หากพิจารณาผลของการศึกษาทดลองหั้งจากการประเมินลักษณะทางกายภาพ เชมี และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อตลอดจนการยอมรับของผู้บริโภค มีความเป็นไปได้และมีศักยภาพเพียงพอสำหรับการผลิตเป็นสบู่สมุนไพรระดับก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลทรรศ์สำหรับการเป็นสบู่ที่มีคุณภาพสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรระดับก้าวหน้าจากน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรัฐรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2557

เอกสารอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. 2542. การนำน้ำดันน้ำเสีย. ห้องหุ้นส่วนจำกัดสยามสเตชั่นเนอร์ชพพลาสติก กรุงเทพมหานคร.

จรัญญา กุลยะ. 2544. การศึกษาพื้นฐานในการผลิตสบู่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ. สถาบันวิจัยวัสดุรุกขเวช, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วรรณนา ใจนันทน์. 2550. ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในrong เท้า. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

วีไลพร ปองเพียร. 2554. การพัฒนาสูตรสบู่สมุนไพรระดับก้าวหน้าจากน้ำมันที่ใช้แล้ว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

ศรีศักดิ์ สุนทรไชย. 2551. โครงการพัฒนาฉลากเคมีภัณฑ์วัตถุอันตราย: การจัดกลุ่มความเป็นอันตรายตามระบบ GHS สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน. ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2545. สบู่กู้ตัว: มอก.29-2545. กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ.

สุมลรัตน์ จันทะผล. 2550. กิจกรรมการยับยั้งจุลทรรศ์ของสารสกัดจากพืชตระกูลส้ม. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สมາລัย ศรีกำไลทอง. 2543. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลวใช้น้ำมันพืชและไขสัตว์: พอลิยูรีเทน ชนิดย่อยสลายโดยธรรมชาติและสบู่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.

Benkebia, N. 2004. Antimicrobial activity of essential oil extracts of various onions (*Allium cepa*) and garlic (*Allium sativum*). Lebensm.-Wiss. U. Technology, 37: 263–268.

- Brahim, M. and Kiranmai, M., 2012, Antibacterial Potential of Different Extracts of *Tagetes erecta* Linn., International Journal of PharmTech Research, 2: 90-96.
- CLSI. 2006. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved StandardNinth Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute. (CLSI) document M2-A9. Wayne, PA.
- Madhavan, S. and S. Rhama, 2011, Antibacterial Activity of the Flavonoid, Patulinrin Isolated from the Flowers of *Tagetes erecta* L., International Journal of PharmTech Research. 3: 1407-1409.
- Mourey, A. and Canillac, N. 2002. Anti-*Listeria monocytogenes* activity of essential oils components of conifers. Food Control.13(4-5):289-292.



กุลสันต์
กุลสันต์