

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

เนื้อหาประจำบท

- ความเป็นมาและความหมายของวิตามิน
- วิตามินที่ละลายในน้ำ
- วิตามินที่ละลายในไขมัน
- กลีโอะแร้

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. สามารถอธิบาย ความเป็นมาและความหมายของวิตามินได้
2. สามารถแบ่งประเภทของวิตามิน โดยใช้เกณฑ์การละลายได้
3. สามารถบอกวิตามินที่อยู่ในกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ำและวิตามินที่ละลายในไขมันได้
4. สามารถอธิบายสมบัติและหน้าที่ของวิตามินที่ละลายในน้ำได้
5. สามารถอธิบายสมบัติและหน้าที่ของวิตามินที่ละลายในไขมันได้
6. สามารถยกตัวอย่างกลีโอะแร้ที่จำเป็นต่อร่างกาย และบอกหน้าที่ของกลีโอะแร้นั้นๆ ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีสอน

1. บรรยาย ประกอบเอกสารประกอบการสอน และ Slide Powerpoint Presentation
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของวิตามินและกลีโอะแร้
4. นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร วารสาร

อินเทอร์เน็ต

5. ทำปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบวิตามิน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษาฟังคำบรรยาย
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการยกตัวอย่างประกอบ
3. นักศึกษาตอบคำถามในชั้นเรียน
4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และอภิปรายเนื้อหา

5. นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ และรายงานผลการค้นคว้า

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตำราต่างๆ
2. Slide Powerpoint Presentation
3. เอกสารสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดีรอม แผ่นภูมิ แผ่นภาพ วีดีทัศน์ และ วีซีดี (VCD) ที่เกี่ยวข้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะเรียน
 - 1.1 ความสนใจและความตั้งใจ
 - 1.2 การจดบันทึก
 - 1.3 การตรงต่อเวลา
 - 1.4 การแต่งกาย
2. การอภิปราย และการตอบคำถามหลังเรียน
 3. พิจารณาจากการทำแบบฝึกหัด
3. พิจารณาผลงานจากการค้นคว้าทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4. การใช้แบบทดสอบ

บทที่ 8

วิตามินและเกลือแร่

การที่มนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้น นอกจากจะบริโภคคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว ยังต้องได้รับสารอาหารอย่างอื่นอีกนั่นคือ วิตามินและเกลือแร่ วิตามินและเกลือแร่ไม่ได้เป็นสารที่ให้พลังงานหลักเหมือนกับคาร์โบไฮเดรต และไขมัน ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของร่างกายเหมือนกับโปรตีน ร่างกายไม่ได้ต้องการวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณมาก เหมือนกับคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน วิตามินและเกลือแร่เป็นสารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย แต่ร่างกายไม่สามารถขาดวิตามินและเกลือแร่ได้ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ หรือบางชนิดสังเคราะห์ได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ถ้าร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

8.1 ความเป็นมาและความหมายของวิตามิน

วิตามิน (Vitamin) เป็นสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อร่างกาย วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ การค้นพบวิตามินสืบเนื่องมาจากการเป็นโรคบางชนิดเช่น โรคเลือดออกตามไรฟัน โรคเหน็บชา และพบว่าเมื่อให้อาหารบางชนิดจะสามารถรักษาโรคดังกล่าวได้ เช่น โรคเหน็บชารักษาได้โดยการให้รำข้าว

มีการค้นพบวิตามินในปี ค.ศ. 1911 โดย คาร์ลสิเมียร์ ฟังก์ (Casimir Funk) นักชีวเคมีชาวโปแลนด์ ได้อธิบายว่า เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิต (vital) และมีสมบัติเป็นสารเอมีน (Amine) จึงตั้งชื่อว่า Vitamine ต่อมาได้พบสารอาหารอีกหลายชนิดที่มีความจำเป็นต่อชีวิตแต่ไม่ได้เป็นสารเอมีนจึงตัด “e” ตัวท้ายทิ้งลงเหลือแต่ “Vitamin” (พัชรี บุญศิริ และคณะ, 2550 : 132)

วิตามินแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามสมบัติการละลายในตัวทำละลาย ดังนี้

1) วิตามินที่ละลายในน้ำ (Water-soluble vitamin) ได้แก่ วิตามินบีทุกชนิด และวิตามินซี วิตามินบีแต่ละชนิดมีหน้าที่ทางชีววิทยาแตกต่างกันออกไป โดยหลายชนิดจะมีความสำคัญในแง่ของการเป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ตามปกติ ส่วนที่เป็นวิตามินของโคเอนไซม์ จะทำหน้าที่ช่วยให้เอนไซม์จับกับซับสเตรตในการเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นถ้าขาดวิตามินสำหรับสร้างโคเอนไซม์เหล่านี้ไป ย่อมมีผลทำให้ปฏิกิริยาที่ควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

นั้นต้องหยุดชะงักลงได้ และเนื่องจากวิตามินประเภทนี้ละลายได้ในน้ำ ดังนั้นจึงถูกกำจัดออกนอกร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่เกิด Hypervitaminosis ขึ้นเหมือนกับวิตามินที่ละลายในไขมัน แต่จากการที่วิตามินประเภทนี้ไม่ถูกเก็บสะสมไว้ในเนื้อเยื่อของร่างกาย จึงทำให้มนุษย์ต้องได้รับวิตามินบี และซีจากอาหารอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับให้สมดุลอยู่ได้ (เรื่องลักษณะ จามิกรณ์, 2544 : 340)


2) วิตามินที่ละลายในไขมัน (Fat-soluble vitamin) วิตามินในกลุ่มนี้ที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค โครงสร้างทางเคมีของวิตามินทั้งสี่ชนิดจะแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดจะละลายในไขมัน ไม่ละลายในน้ำ และถูกเก็บสะสมไว้ในส่วนไขมันของร่างกาย โดยเฉพาะที่ตับ ดังนั้นผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารพวกไขมัน จึงอาจมีปัญหาในการดูดซึมวิตามินประเภทนี้ตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายได้รับวิตามินประเภทนี้มากเกินไปจะทำให้เกิด Hypervitaminosis คือ วิตามินจะไปรวมตัวกันมากเกินไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้ (เรื่องลักษณะ จามิกรณ์, 2544 : 339)

8.2 วิตามินที่ละลายในน้ำ

วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามินซี และวิตามินบีทุกชนิด คือ วิตามินบี 1 หรือไทอามีน วิตามินบี2 หรือไรโบฟลาวิน กรดนิโคตินิก กรดแพนโททีนิก วิตามินบี6 หรือไพริดอกซีน ไบโอติน กรดโฟลิก และวิตามินบี12 หรือโคบาลามิน

8.2.1 วิตามินบี1

วิตามินบี1 หรือไทอามีน (Thiamine) เป็นสารประเภทเอมีน (Amine) ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชัน $-NH_2$ และมีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยวงแหวน 2 วง คือ วงแหวนไพริมิดีน (Pyrimidine ring) และวงแหวนไทอะโซล (Thiazole ring) ซึ่งวงแหวนไทอะโซลสลายตัวได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาวะเบส หรือโดนแสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet) โดยเฉพาะเมื่อมีทองแดงเป็นตัวเร่ง ดังนั้นถ้าทำอาหารในภาชนะทองแดงและในสภาวะเบสจะทำให้วิตามินบี1 ถูกทำลาย โครงสร้างของวิตามินบี1 แสดงดังรูปที่ 8.1



รูปที่ 8.1 โครงสร้างของวิตามินบี1

วิตามินบี 1 เป็นสารตั้งต้น ในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ Thiamine pyrophosphate (TPP) ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ของสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต และลิปิด ดังนั้นความต้องการวิตามินบี1 ในร่างกายจะขึ้นอยู่กับสารอาหารที่ให้พลังงานที่ร่างกายได้รับ นอกจากนี้โคเอนไซม์ TPP ยังมีบทบาทต่อระบบประสาท โดยเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งสัญญาณประสาทไปตามเส้นใยประสาท และยังพบว่ามีความสำคัญในการสังเคราะห์อะซิติลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อสัญญาณประสาท (Neurotransmitter) (พัชรี บุญศิริ และคณะ, 2550 : 135)


การขาดวิตามินบี 1 จะทำให้เป็นโรคเหน็บชา (Beriberi) มีผลต่อระบบประสาท หัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินอาหาร สาเหตุของการขาดวิตามินบี1 คือ การรับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามโภชนาการ การเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และการรับประทานอาหารที่มีสารที่สามารถทำลายวิตามินบี1 หรือทำให้ร่างกาย ไม่สามารถดูดซึมวิตามินบี1 ได้ เช่น ไทอามินเอส (Thiaminase) เป็นเอนไซม์ที่ทำลายวิตามินบี1 พบในปลา หอยลาย ดังนั้นการรับประทานปลาดิบเป็นประจำ จะทำให้ขาดวิตามินบี1 ได้ ส่วนสารที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินบี1 ได้ เช่น กรดคาเฟอิก (Caffeic acid) พบในใบชา กาแฟ สามารถจับกับวิตามินบี1 แล้วทำให้ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

แหล่งอาหารของวิตามินบี 1 ได้แก่ ธัญพืช เช่น ข้าว โดยพบในส่วนเยื่อของเปลือกหุ้มเมล็ด ดังนั้นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้องจะพบวิตามินบี1 ได้มากกว่าข้าวขาว นอกจากนี้ยังพบในเนื้อหมู ยีสต์ ถั่ว ไข่แดง และนม เป็นต้น

8.2.2 วิตามินบี2

วิตามินบี2 หรือไรโบฟลาวิน (Riboflavin) โครงสร้างประกอบด้วยวงแหวนไอโซอัลลอกซาซีน (Isoalloxazine) และน้ำตาลไรโบส (Ribose) วิตามินบี2 สลายตัวได้ง่ายเมื่ออยู่

ในสภาวะเบส หรือโดนแสงอัลตราไวโอเล็ต แต่ค่อนข้างเสถียรต่อความร้อน และในสภาวะกรด โครงสร้างของวิตามินบี2 แสดงดังรูปที่ 8.2



รูปที่ 8.2 โครงสร้างของวิตามินบี2


วิตามินบี 2 เป็นสารตั้งต้น ในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ Flavin mononucleotide (FMN) และ Flavin adenine dinucleotide (FAD) ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน โดยทำหน้าที่เป็นหมู่พรอสเทติกของเอนไซม์ ในกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอน (Electron transport system) เรียกเอนไซม์ที่มี FMN หรือ FAD เป็นหมู่พรอสเทติกว่า ฟลาโวโปรตีน (Flavoprotein) หรือเอนไซม์ Dehydrogenase โดย FMN และ FAD ทำหน้าที่เป็นตัวรับอะตอมไฮโดรเจน นอกจากนี้วิตามินบี2 ยังเกี่ยวข้องในปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันและเกี่ยวข้องในการรักษาสุขภาพของเยื่อผิวของตาและของอวัยวะต่างๆ อีกด้วย (พัชรี บุญศิริ และคณะ, 2550 : 137)

การขาดวิตามินบี 2 จะทำให้เป็นแผลที่มุมปาก เรียกว่า ปากนกกระจอก (Angular stomatitis) นอกจากนี้มักเกิดอาการลิ้นอักเสบ เยื่อตาอักเสบ การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ และอาการอักเสบของผิวหนัง

แหล่งอาหารของวิตามินบี 2 ได้แก่ พืชใบเขียว โดยพืชสีเขียวสามารถสังเคราะห์วิตามินนี้ได้ เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อปลา เครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับ และไต ไข่ นม

8.2.3 กรดนิโคตินิก

กรดนิโคตินิก (Nicotinic acid) หรือไนอาซิน (Niacin) โครงสร้างทางเคมีประกอบด้วยวงแหวนไพริดีน (Pyridine) และมีหมู่คาร์บอกซิล (Carboxyl) เป็นหมู่ฟังก์ชัน ในธรรมชาติพบอนุพันธ์ของกรดนิโคตินิกในรูปนิโคตินาไมด์ ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกรดนิโคตินิก กรดนิโคตินิกมีความเสถียรทนต่อความร้อน กรด เบส และแสง โครงสร้างของกรดนิโคตินิก และนิโคตินาไมด์แสดงดังรูปที่ 8.3



รูปที่ 8.3 โครงสร้างของกรดนิโคตินิกและนิโคตินาไมด์


กรดนิโคตินิก เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ 2 ชนิด ได้แก่ Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD^+) และ Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP^+) ซึ่งเป็นตัวรับไฮโดรเจนของปฏิกิริยาที่สำคัญหลายปฏิกิริยาในกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกาย เช่น NAD^+ เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาออกซิเดชันในวิถีไกลโคลิซิส (Glycolysis) และกระบวนการขนถ่ายอิเล็กตรอน NADP^+ เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์กรดไขมัน และคอเลสเตอรอล

การขาดกรดนิโคตินิก จะทำให้เกิดโรคเพลลากรา (Pellagra) มีอาการท้องเดิน (Diarrhea) อาการทางประสาท (Dementia) ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ความจำสับสนและเสื่อม และมีอาการทางผิวหนัง (Dermatitis) ร่วมด้วย คือ บริเวณผิวหนังที่ถูกแดดจะแดงและคล้ำ ผิวหนังเกิดแผลได้ (คาวัลย์ ฉิมภู, 2548 : 230)

แหล่งอาหารของกรดนิโคตินิก ได้แก่ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลา เป็นต้น แหล่งที่มีน้อย เช่น น้ำมัน ไข่ ผัก และผลไม้ แต่น้ำมันและไข่มีทริปโทเฟน (Tryptophan) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นกรดนิโคตินิกได้

8.2.4 กรดแพนโททีนิก

กรดแพนโททีนิก (Pantothenic acid) เป็นสารที่คล้ายเปปไทด์ (Peptide) เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดแพนโทอิก (Pantoic acid) กับเบตาอะลานีน (β -alanine) สลายตัวได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาวะกรด เบส ความร้อน โครงสร้างของกรดแพนโททีนิกแสดงดังรูปที่ 8.4



ส่วนที่มาจากกรดแพนโทอิก

ส่วนที่มาจากเบตาอะลานีน


รูปที่ 8.4 โครงสร้างของกรดแพนโททีนิก

กรดแพนโททีนิกเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์เอ (Coenzyme A) มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและลิพิด โดยเฉพาะกรดไขมัน โดยเป็นองค์ประกอบของสารตัวกลาง ในกระบวนการเมแทบอลิซึมที่สำคัญคือ อะซิติลโคเอ (Acetyl coA) และเกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ฮีม (Heme) ดังนั้นคนที่โรคลโลหิตจางมีสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดกรดแพนโททีนิก

การขาดกรดแพนโททีนิกมักไม่พบ เนื่องจากกรดแพนโททีนิกพบในอาหารทุกชนิด ถ้าขาดกรดแพนโททีนิกจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเมื่อยล้า กล้ามเนื้อกระตุก ติดเชื้อได้ง่าย แหล่งอาหารของกรดแพนโททีนิก ได้แก่ อาหารทุกประเภททั้งจากพืช และสัตว์ โดยพบมากในไข่ ตับ ใต ยีสต์ ถั่ว

8.2.5 วิตามินบี6

วิตามินบี 6 หรือไพริดอกซีน (Pyridoxine) เป็นสารประกอบไพริดีน (Pyridine) นอกจากนี้วิตามินบี6 ยังรวมถึงอนุพันธ์ของไพริดอกซีน 2 ชนิด คือ ไพริดอกซาล (Pyridoxal) และไพริดอกซามีน (Pyridoxamine) วิตามินบี6 สลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนแสง และโดนความร้อนในสภาวะเบส แต่จะทนความร้อนได้ดีในสภาวะกรด โครงสร้างของไพริดอกซีน และอนุพันธ์แสดงดังรูปที่ 8.5



รูปที่ 8.5 โครงสร้างของไพริดอกซินและอนุพันธ์


วิตามินบี6 เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ Pyridoxal phosphate (PLP) และ Pyridoxamine phosphate ซึ่งทั้งสองชนิดมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ยังช่วยในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และยังเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนกรดอะมิโนทริปโทเฟนไปเป็นกรดนิโคตินิก ดังนั้นถ้าขาดวิตามินบี6 อาจทำให้เกิดการขาดกรดนิโคตินิกด้วย

การขาดวิตามินบี 6 จะพบได้น้อยมาก เนื่องจากในอาหารมีเพียงพอ แต่จะพบได้ในคนที่การดูดซึมอาหารผิดปกติ (Malabsorption syndrome) หรือผู้ที่เป็โรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้ที่ขาดวิตามินบี6 จะมีอาการ โลหิตจาง ผิวหนังอักเสบ การเสื่อมของเส้นประสาท

แหล่งอาหารของวิตามินบี 6 ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว ผัก ผลไม้ แบคทีเรียในลำไส้สามารถสังเคราะห์วิตามินบี6 ได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

8.2.6 ไบโอติน

ไบโอติน (Biotin) เป็นสารที่ประกอบด้วยวงแหวนไทโอเฟน (Thiophene) ที่มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ไบโอตินทนต่อความร้อน แต่สลายตัวได้ง่ายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โครงสร้างของไบโอตินแสดงดังรูปที่ 8.6



รูปที่ 8.6 โครงสร้างของไบโอติน


ไบโอติน เป็นโคเอนไซม์ของปฏิกิริยา ที่เกี่ยวข้องกับการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ (Carboxylation) นอกจากนี้ยังมีส่วนในการบำรุงรักษาผิวหนัง ผม เซลล์ประสาท ไชกระดูก และมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์กรดนิโคตินิกจากกรดอะมิโนทริปโทเฟน

ไบโอติน หรือบางครั้งเรียกว่า วิตามินเอช (H) เป็นวิตามินที่แบคทีเรียในลำไส้ สามารถสังเคราะห์ได้ ดังนั้นการขาดไบโอตินจึงพบได้ยาก อย่างไรก็ตามการขาดไบโอตินสามารถเกิดขึ้นได้ในคนที่รับประทานไข่ดิบเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในไข่ขาวจะมีโปรตีนที่สามารถจับกับไบโอตินได้อย่างดี ทำให้ไบโอตินไม่สามารถทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ได้ แต่ถ้าทำให้ไข่สุก จะทำให้โปรตีนดังกล่าวเสียสภาพธรรมชาติ จึงไม่สามารถจับกับไบโอตินได้ (Bruice, Paula Y., 2006 : 472) การขาดไบโอตินจะทำให้มีอาการผิวหนังอักเสบ เบื่ออาหาร วิงเวียน อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ และซึมเศร้า เป็นต้น

แหล่งอาหารของไบโอติน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ตับ ไข่ ยีสต์ นอกจากนี้แบคทีเรียในลำไส้สามารถสังเคราะห์ไบโอตินได้

8.2.7 กรดโฟลิก

กรดโฟลิก (Folic acid) หรือโฟลาซิน (Folacin) เป็นสารที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เทอริดีน (Pteridine) กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก (*p*-Aminobenzoic acid) และกรดกลูตามิก (Glutamic acid) กรดโฟลิกที่อยู่ในรูปสารละลายจะสลายตัวได้ง่าย เมื่อถูกความร้อนแต่ถ้าอยู่ในรูปของแข็งจะสลายตัวง่ายเมื่อโดนแสง โครงสร้างของกรดโฟลิกแสดงดังรูปที่ 8.7




รูปที่ 8.7 โครงสร้างของกรดโฟลิก

กรดโฟลิกเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ Tetrahydrofolate (FH_4 หรือ THF) ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการชีวสังเคราะห์สารต่างๆ เช่น เบสพิวรีน เบสไพริมิดีนของกรดนิวคลีอิก จึงมีความจำเป็นต่อการสร้างดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ

การขาดกรดโฟลิกเกิดได้จากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ผู้ที่มีปัญหาการดูดซึมอาหารผิดปกติ การขาดกรดโฟลิกจะทำให้เป็นโรคโลหิตจางชนิด Megaloblastic anemia เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เบสพิวรีนและไพริมิดีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ) ได้ ทำให้การเจริญและการแบ่งตัวของนิวเคลียสช้าลง จึงมีผลต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นเซลล์ที่ร่างกายสร้างขึ้นตลอดเวลา แหล่งอาหารของกรดโฟลิก ได้แก่ ผักใบเขียว เนื้อสัตว์ ตับ และถั่ว

8.2.8 วิตามินบี12

วิตามินบี 12 หรือโคบาลามิน (Cobalamin) เป็นสารที่ประกอบด้วยวงแหวนคอรีน (Corrin ring) ล้อมรอบโลหะโคบอลต์ มีโครงสร้างใหญ่และซับซ้อน วิตามินบี12 สลายตัวได้ในสภาวะกรด เบส และปฏิกิริยาออกซิเดชัน โครงสร้างของวิตามินบี12 แสดงดังรูปที่ 8.8



รูปที่ 8.8 โครงสร้างของวิตามินบี12


วิตามินบี 12 เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ Adenosylcobalamine ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาหลายปฏิกิริยา เช่น การเปลี่ยนไรโบนิวคลีโอไทด์ (Ribonucleotide) ไปเป็นดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ (Deoxyribonucleotide) ในกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดไขมัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นการเจริญเติบโตในเด็ก เพิ่มความอยากอาหารทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น

การขาดวิตามินบี 12 มักไม่ค่อยพบในคนปกติ เพราะความต้องการวิตามินบี12 ของร่างกายมีปริมาณต่ำมาก (ในระดับไมโครกรัม) แต่จะพบในผู้ที่บริโภคเฉพาะผัก นอกจากนี้ยังพบในผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมวิตามิน การขาดวิตามินบี12 จะทำให้เป็นโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง และมีการทำลายของประสาทไขสันหลัง เนื่องจากการขาดวิตามินบี12 จะทำให้ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ดีเอ็นเอในไขกระดูกซึ่งทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดง

แหล่งอาหารของวิตามินบี 12 ได้แก่ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ตับ ไต หัวใจ

8.2.9 วิตามินซี

วิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) เป็นสารที่ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (Hydroxyl, -OH) 4 หมู่ จึงละลายตัวได้ง่ายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยเฉพาะเมื่อมีความร้อนจะทำให้วิตามินซีละลายตัวเร็วขึ้น โครงสร้างของวิตามินซีแสดงดังรูปที่ 8.9



รูปที่ 8.9 โครงสร้างของวิตามินซี

วิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์คอลลาเจน (Collagen) ที่เป็นโปรตีนในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ดังนั้นวิตามินซีจึงมีความสำคัญในการสังเคราะห์และรักษาสภาพของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รวมทั้งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อในด้านการซ่อมแซมบริเวณที่เป็นแผล จึงป้องกันโรคลักปิดลักเปิด (Scurvy) ได้ นอกจากนี้ยังจำเป็นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนกลุ่มสเตอรอยด์ วิตามินซียังเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของเหล็ก โดยช่วยเพิ่มการดูดซึมเหล็ก และวิตามินซีมีสมบัติเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วยป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์ จะเห็นว่าวิตามินซีเป็นวิตามินตัวเดียวในกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ำ ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ที่ชัดเจน

การขาดวิตามินซี จะทำให้เป็นโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งมีอาการเลือดออกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ไรฟัน ปวดเหงือก โลหิตจาง ร่างกายติดเชือดีง่าย


แหล่งอาหารของวิตามินซี ได้แก่ ผัก และ ผลไม้ โดยเฉพาะพวกพืชตระกูลส้ม เช่น ส้มเขียวหวาน มะนาว นอกจากนี้ยังพบมากในฝรั่ง และมะขามป้อม เนื่องจากวิตามินซีละลายตัวได้ง่ายมากดังนั้นอาหารที่ผ่านการปรุงที่นานจะทำให้สูญเสียวิตามินซีได้

8.3 วิตามินที่ละลายในไขมัน

วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ซึ่งเป็นสารที่ประกอบด้วยไอโซพรีน (Isoprene unit)

8.3.1 วิตามินเอ

วิตามินเอ หรือเรตินอล (Retinol) เป็นสารที่ประกอบด้วยหน่วยไอโซพรีนมาเชื่อมต่อกัน วิตามินเอละลายตัวง่ายเมื่อโดนแสง หรือความร้อน นอกจากวิตามินเอจะอยู่ในรูปเรตินอลแล้ว ในธรรมชาติยังพบสารที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอได้เรียกว่า โปรวิตามินเอ (Provitamin A) คือ แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ซึ่งเป็นรงควัตถุในพืชประกอบด้วยแคโรทีน (Carotene) โดยชนิดที่มีมากที่สุดคือ เบตาแคโรทีน (β -carotene) โครงสร้างของเรตินอลและเบตาแคโรทีนแสดงดังรูปที่ 8.10



รูปที่ 8.10 โครงสร้างของเรตินอลและเบตาแคโรทีน


วิตามินเอ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์หูด (Rods) และโคน (Cones) ซึ่งเป็นเซลล์ที่เป็นตัวรับแสงในเรตินาของนัยน์ตา จึงมีความสำคัญต่อการปรับสายตาในที่ที่มีแสงสว่างไม่พอ นอกจากนี้ยังช่วยในการเจริญและพัฒนาของเซลล์บุผิว (Epithelial membrane) และมีบทบาทในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน

การขาดวิตามินเอ จะทำให้เกิดอาการตาบอดกลางคืน (Night blindness) นั่นคือมองเห็นได้ไม่ดีในขณะที่มีแสงสลัว และถ้าหากขาดวิตามินเอเป็นเวลานาน อาจทำให้เปลือกตาอักเสบ ต่อม้ำตาไม่สามารถผลิตน้ำตาได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อเยื่อผิวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย และยังมีผลต่อการเจริญเติบโตอีกด้วย


แหล่งอาหารของวิตามินเอ โดยแหล่งของเรดิ นอลพบในอาหารที่มีจากสัตว์ เช่น นม ไข่ และน้ำมันตับปลา เป็นต้น แหล่งของโปรวิตามินเอพบในผักและผลไม้ที่มีรงควัตถุสีแดง ส้ม เหลือง เช่น มะละกอ แครอท ฟักทอง และผักใบเขียวเข้ม เป็นต้น

8.3.2 วิตามินดี

วิตามินดีเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ ซึ่งต่างจากวิตามินเอ อี และเค มีหลายชนิดด้วยกัน ชนิดที่สำคัญที่สุด คือ วิตามิน D₂ หรือเอโรคัลซิเฟอรอล (Erocalciferol) ดังรูปที่ 8.11 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสเตอรอลในพืช (Plant sterol) และวิตามิน D₃ หรือโคเลคัลซิเฟอรอล (Cholecalciferol) พบมากในน้ำมันตับปลา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 7-ดีไฮโดรคอเลสเตอรอล (7-dehydrocholesterol) ที่ผิวหนังของคนและสัตว์ (อาภัสสรา ชมิดท์, 2543 : 112) สามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน D₃ ได้เมื่อได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด แสดงดังรูปที่ 8.12



รูปที่ 8.11 โครงสร้างของวิตามิน D₂



รูปที่ 8.12 การเปลี่ยน 7-ดีไฮโดรคลอเลสเทอรอลไปเป็นวิตามิน D₃


วิตามินดี มีหน้าที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม และฟอสฟอรัส รักษาระดับของแคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

การขาดวิตามินดี จะทำให้ระดับของแคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดต่ำ ทำให้มีการนำเอาธาตุทั้งสองจากกระดูกมาใช้ ส่งผลให้แคลเซียมในกระดูกเสียไป ทำให้เกิดเป็นโรคกระดูกอ่อน นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดอาการชักและกล้ามเนื้อเกร็ง เนื่องจากวิตามินดีเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วย


แหล่งอาหารของ วิตามินดี ได้แก่ น้ำมันตับปลา ไข่ เนย นมสด และการได้รับแสงแดดทำให้ร่างกายสามารถเปลี่ยนสารตั้งต้นเป็นวิตามินดีได้

8.3.3 วิตามินอี


วิตามินอี หรือโทโคเฟอรอล (Tocopherol) ในธรรมชาติพบวิตามินอีได้ 4 รูปแบบ คือ แอลฟา (α), เบตา (β), แกมมา (γ), และ เดลตา (δ) tocopherol ซึ่ง α -โทโคเฟอรอล มี activity สูงที่สุด วิตามินอีเสถียรต่อความร้อน ถูกออกซิไดส์ (oxidize) ได้ง่ายมาก จึงมีสมบัติเป็นสาร แอนติออกซิแดนซ์ โครงสร้างของวิตามินอีแสดงดังรูปที่ 8.13




α -โทโคเฟอรอล



β -โทโคเฟอรอล



γ -โทโคเฟอรอล



δ -โทโคเฟอรอล

รูปที่ 8.13 โครงสร้างของวิตามินอี


หน้าที่ของวิตามินอี คือ เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ ป้องกันเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ให้ถูกออกซิไดส์ จึงเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล์และโครงสร้างภายในเซลล์

การขาดวิตามินอี ทำให้เกิดอาการผิดปกติที่พบได้ เช่น ภาวะโลหิตจาง และกล้ามเนื้อลีบ เป็นต้น


แหล่งอาหารของวิตามินอี พบ มากในน้ำมันพืช เช่น น้ำมันเมล็ดคําฝอย และน้ำมันถั่วเหลือง ไข่ ตับ และผักใบเขียว

8.3.4 วิตามินเค


วิตามินเค ในธรรมชาติพบ 3 รูปแบบ คือ วิตามิน K₁ หรือฟิโลควิโนน (Phylloquinone) ซึ่งพบในพืช วิตามิน K₂ หรือมีนาควิโนน (Menaquinone) พบในสัตว์ และวิตามิน K₃ หรือมีนาไดโอน (Menadione) ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี มีฤทธิ์แรงกว่าวิตามิน K₁ และวิตามิน K₂ โครงสร้างของวิตามิน K₁ วิตามิน K₂ และวิตามิน K₃ แสดงดังรูปที่ 8.14



วิตามิน K₁



วิตามิน K₂



วิตามิน K₃

รูปที่ 8.14 โครงสร้างของวิตามิน K₁ วิตามิน K₂ และวิตามิน K₃

หน้าที่ของวิตามินเค คือ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด โดยมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ โพรทรอมบิน (Prothrombin) เปลี่ยนเป็นทรอมบิน (Thrombin) ซึ่งทรอมบินจะเปลี่ยนไฟบริโนเจน (Fibrinogen) ให้เป็นไฟบริน (Fibrin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีลักษณะเป็นร่างแหป้องกันไม่ให้เลือดออกและแข็งตัวในที่สุด

การขาดวิตามินเค จะทำให้การแข็งตัวของเลือดช้าลง เกิดเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemorrhagic disease) โดยทั่วไปแล้วมักไม่ค่อยพบผู้ที่ขาดวิตามินเค เนื่องจากแบคทีเรียในลำไส้สามารถสังเคราะห์วิตามิน K₂ ได้ ยกเว้นผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำลายแบคทีเรียในลำไส้ หรือผู้ที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ มีปัญหาการดูดซึมอาหาร แหล่งอาหารของวิตามินเค ได้แก่ ผัก ไข่แดง ตับ และไต เป็นต้น

8.4 เกลือแร่

เกลือแร่ (Mineral) หรือแร่ธาตุ เป็นสารอนินทรีย์ที่จำเป็นต่อร่างกาย เกลือแร่จะคล้ายกับวิตามินตรงที่ ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มาก แต่ร่างกายขาดไม่ได้ เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายมีหลายชนิด บางชนิดร่างกายต้องการมาก เช่น แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โซเดียม (Na) โพแทสเซียม (K) และแมกนีเซียม (Mg) เป็นต้น เกลือแร่บางชนิดร่างกายต้องการน้อย (ระดับมิลลิกรัมถึง ไมโครกรัม) เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ไอโอดีน (I) และสังกะสี (Zn) เป็นต้น

8.4.1 แคลเซียม

แคลเซียม เป็นเกลือแร่ที่พบในร่างกายมากกว่าเกลือแร่ชนิดอื่น โดยพบมากที่กระดูก และฟัน แคลเซียมเป็นเกลือแร่ที่ทำงานร่วมกับฟอสฟอรัส

ประโยชน์ของ แคลเซียมมีดังนี้ เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ช่วยในการแข็งตัวของเลือด ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ ถ้าแคลเซียมในเลือดน้อยจะทำให้เกิดภาวะการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ ถ้าขาดแคลเซียมจะทำให้เป็นโรคกระดูกอ่อน

แหล่งอาหารของแคลเซียม ได้แก่ นม เนย กระดูกที่รับประทานได้ เช่น ปลาป่น ปลากรอบ ถั่ว ไข่ ผัก และผลไม้

8.4.2 ฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัส เป็นเกลือแร่ที่พบมากในกระดูกและฟัน ประโยชน์ของฟอสฟอรัส คือ เป็นองค์ประกอบของกระดูกและฟัน เป็นส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก และนิวคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein) ซึ่งทำหน้าที่ในการแบ่งตัวของเซลล์ และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เป็นส่วนประกอบของฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในเยื่อเซลล์และลิโปโปรตีน

(Lipoprotein) ซึ่งช่วยในการขนส่งไขมัน นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความสมดุลของกรด และเบสในเลือด

แหล่งอาหารของ ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสจะพบในอาหารเกือบทุกชนิด อาหารที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูงมักจะมีฟอสฟอรัสสูงด้วย เช่น เนื้อ ไข่ นม

8.4.3 โซเดียม และโพแทสเซียม

โซเดียมและโพแทสเซียมจะเกี่ยวข้องกับของเหลวในร่างกาย โดยโซเดียมจะพบในของเหลวนอกเซลล์ ส่วนโพแทสเซียมจะพบในของเหลวในเซลล์ โซเดียมและโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลน้ำ และสมดุลของเหลวภายในร่างกาย โดยโซเดียมในรูปแคตไอออน (Na^+) จะรักษาความดันออสโมติก (Osmotic) ภายนอกเซลล์ และโพแทสเซียมในรูปแคตไอออน (K^+) รักษาความดันออสโมติกภายในเซลล์ มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลกรดเบส

แหล่งอาหารของโซเดียม พบมากใน อาหารทะเลเกลือแกง และยังพบในอาหารทั่วไป เช่น ไข่ นมสด เนย ส่วนแหล่งอาหารของโพแทสเซียม พบมากในมะเขือเทศ ถั่วลิสง ส้ม มันเทศ

8.4.4 แมกนีเซียม

แมกนีเซียม พบในกระดูก และของเหลวภายนอกเซลล์ แมกนีเซียมเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิด เช่น เอนไซม์ในวิถีไกลโคไลซิส ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและประสาท จำเป็นต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย แมกนีเซียมพบในอาหารทั่วไป พบมากในผักสีเขียว

8.4.5 เหล็ก

เหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน (Heme) และฮีโมโกลบินเป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดง นอกจากนี้เหล็กยังเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิด ธาตุเหล็กในอาหารจะอยู่ในรูป Fe^{3+} ซึ่งจะถูกรีดิวซ์ให้เป็น Fe^{2+} โดยวิตามินซี แล้ว Fe^{2+} จะถูกดูดซึมไปใช้ในร่างกาย การขาดธาตุเหล็กจะทำให้เป็นโรคโลหิตจางได้ ผู้ที่ต้องการธาตุเหล็กมากกว่าปกติ ได้แก่ ผู้หญิงที่มีประจำเดือน ผู้หญิงมีครรภ์แก่และในผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดขาดธาตุเหล็ก (Iron-deficient anemia) ธาตุเหล็กพบมากในตับ ตับ ผักสีเขียว นอกจากนี้ยังพบในไข่แดง ปลา ข้าวสาลี ถั่ว

8.4.6 ทองแดง

ทองแดง เป็นธาตุที่จำเป็นในการสร้างเฮโมโกลบิน โดยช่วยนำเหล็กไปเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน ทองแดงเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิด เช่น เอนไซม์ Tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเมลานิน ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจาก

แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ทองแดงยังช่วยสร้างเยื่อป้องกันเส้นประสาทและบำรุงรักษาด้วย ถ้าขาดทองแดงจะทำให้เป็นโรคโลหิตจาง แหล่งของทองแดงพบมากในหอยนางรมและหอยต่างๆ ตับ ไข่ และถั่ว

8.4.7 ไอโอดีน

ไอโอดีน จำเป็นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซีน (Thyroxine) ซึ่งฮอร์โมนไทรอกซีน ทำหน้าที่ควบคุมอัตราเมแทบอลิซึมในร่างกาย และเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะโครงสร้างของร่างกาย ระบบประสาทและสมอง การขาดไอโอดีนจะทำให้เป็นโรคคอพอก (goiter) การเจริญเติบโตของร่างกายและสมองผิดปกติ แหล่งของไอโอดีนพบมากในเกลือที่ได้จากน้ำทะเลหรือเกลือสมุทร และอาหารทะเล

8.4.8 สังกะสี

สังกะสีมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การสืบพันธุ์ สังกะสีเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิด การขาดสังกะสีจะทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายช้าลง ทำให้แผลหายช้า การรับรสและกลิ่นเสียไป มีความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แหล่งของสังกะสีพบมากในเนื้อสัตว์ ตับ ไข่ นม หอย แต่อาหารพวกผักจะมีสังกะสีต่ำ

สรุปท้ายบท

วิตามิน (Vitamin) เป็นสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อร่างกาย วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะช่วยให้อวัยวะทำงานได้อย่างปกติ วิตามินแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามสมบัติการละลายในตัวทำละลาย คือ วิตามินที่ละลายในน้ำ และวิตามินที่ละลายในไขมัน วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามินบี1 วิตามินบี2 กรดนิโคตินิก กรดแพนโททีนิก วิตามินบี6 ไบโอติน กรดโฟลิก วิตามินบี12 และวิตามินซี ซึ่งวิตามินแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันไป โดยหลายชนิดจะมีความสำคัญในการเป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ เนื่องจากวิตามินประเภทนี้ละลายได้ในน้ำ ดังนั้นจึงถูกกำจัดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว และจากการที่วิตามินประเภทนี้ไม่ถูกเก็บสะสมไว้ในเนื้อเยื่อของร่างกาย จึงทำให้มนุษย์ต้องได้รับวิตามินบีและซีจากอาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถรักษาระดับให้สมดุลอยู่ได้ วิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินในกลุ่มนี้ที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค วิตามินกลุ่มนี้จะถูกเก็บสะสมไว้ในส่วนไขมันของร่างกายโดยเฉพาะที่ตับ ดังนั้นผู้ที่มิมีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารพวกไขมัน จึงอาจมีปัญหาในการดูดซึมวิตามินประเภทนี้ตามไป


ด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายได้รับวิตามินประเภทนี้มากเกินไปจะทำให้เกิด hypervitaminosis คือวิตามินจะไปรวมตัวกันมากเกินไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้

เกลือแร่ (Mineral) หรือแร่ธาตุ เป็นสารอนินทรีย์ที่จำเป็นต่อร่างกาย เกลือแร่จะคล้ายกับวิตามินตรงที่ ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มาก แต่ร่างกายขาดไม่ได้ เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายมีหลายชนิด บางชนิดร่างกายต้องการมาก เช่น แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โซเดียม (Na) โพแทสเซียม (K) และแมกนีเซียม (Mg) เป็นต้น เกลือแร่บางชนิดร่างกายต้องการน้อย (ระดับมิลลิกรัมถึงไมโครกรัม) เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ไอโอดีน (I) และสังกะสี (Zn) เป็นต้น


แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความเหมือนระหว่างวิตามินกับเกลือแร่ ในด้านความต้องการและประโยชน์ต่อร่างกาย
2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างวิตามินกับเกลือแร่ ในด้านสมบัติทางเคมี
3. จงอธิบายความหมายและความเป็นมาของคำว่า “Vitamin”
4. วิตามินที่ร่างกาย ไม่สามารถเก็บสะสมไว้ในร่างกายได้ ต้องได้รับจากอาหารอย่างสม่ำเสมอ คือวิตามินในกลุ่มใด ประกอบด้วยวิตามินชนิดใดบ้าง
5. ผู้ที่มีปัญหาการดูดซึมอาหารพวกไขมัน จะทำให้ขาดวิตามินในกลุ่มใด และประกอบด้วยวิตามินชนิดใดบ้าง
6. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วนำมาเป็นข้อมูลในการเติมชื่อวิตามินให้ตรงกับโครงสร้างทางเคมีต่อไปนี้
 - ก) วิตามินบี1 เป็นสารประเภทเอมีน (Amine) ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชัน $-NH_2$ และมีธาตุกำมะถัน
 - ข) วิตามินบี2 ประกอบด้วยวงแหวนไอโซอัลลอกซาซีน (Isoalloxazine) และน้ำตาลไรโบส
 - ค) กรดนิโคตินิกประกอบด้วยวงแหวนอะนิลีน (Aniline) และมีหมู่คาร์บอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน
 - ง) ไบโอทีนประกอบด้วยวงแหวนไทโอเฟน (Thiophene) ซึ่งมีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ
 - จ) วิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิก ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล 4 หมู่
จงเติมชื่อวิตามินได้โครงสร้างทางเคมีต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


1)




2)




3)



4)



5)



7. จงบอกหน้าที่สำคัญของวิตามินชนิดต่างๆ ดังนี้

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) วิตามินบี1 | 2) วิตามินบี2 |
| 3) กรดนิโคตินิก | 4) กรดแพนโททีนิก |
| 5) วิตามินบี6 | 7) ไบโอติน |
| 8) กรดโฟลิก | 9) วิตามินบี12 |
| 10) วิตามินซี | 11) วิตามินเอ |
| 12) วิตามินดี | 13) วิตามินอี |
| 14) วิตามินเค | |

8. กลีโธแร่ชนิดใดบ้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง

9. กลีโธแร่ชนิดใดบ้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

10. กลีโธแร่ชนิดใดบ้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

เอกสารอ้างอิง

ดาวัลย์ ฉิมภู. (2548). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัชรี บุญศิริ เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ อุบล ชาอ่อน และปิติ ฐวจิตต์. (2550). ตำราชีวเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 5. ขอนแก่น : คลังน่านาวิทยา.

เรื่องลักษณะ จามิกรณ์. (2544). ชีวเคมีเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อาภัสสรฯ ชมิคท์. (2543). ชีวเคมี. กรุงเทพฯ : ไร่เขียว.

Bruice, Paula Y. (2006). **Essential Organic Chemistry**. New York, NY : Pearson/Prentice Hall.

