

## บทที่ 4

### ฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอร์

ฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์เป็นโครงสร้างที่สำคัญในการอธิบายสมบัติต่าง ๆ ของปริภูมิเวกเตอร์ ในบทนี้จะกล่าวถึงนิยามและทฤษฎีบทเกี่ยวกับฐานหลัก การหาฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์ และฐานหลักของปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ จากบทที่แล้ว ได้ศึกษาเกี่ยวกับเซตที่แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ และเซตที่เป็นหรือไม่เป็นอิสระเชิงเส้น โดยทราบว่า ถ้าเซตใดแผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ แล้วหมายความว่า เซตนั้นจะมีเวกเตอร์มากพอที่จะทำให้เกิดปริภูมิเวกเตอร์ และเซตใดเป็นอิสระเชิงเส้นในปริภูมิเวกเตอร์ แล้วแสดงว่าเซตนั้นมีเวกเตอร์ชนิดที่ไม่เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์อื่น แต่ถ้าเซตของเวกเตอร์ใดมีสมบัติทั้ง 2 อย่างนี้ แล้วจะได้ว่า เซตนั้นมีเวกเตอร์เฉพาะที่จำเป็นที่จะแผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์เท่านั้น

#### 4.1 ฐานหลัก (Basis)

**นิยาม 4.1** ให้  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์บนฟิลด์  $F$  และ  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นเซตของเวกเตอร์ใน  $V$  จะเรียก  $S$  ว่าเป็น **ฐานหลัก (Basis)** ของ  $V$  ก็ต่อเมื่อ

1.  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น
2.  $S$  แผ่ทั่ว  $V$

**ตัวอย่าง 4.1** ในปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^2$  ให้  $S_1 = \{(1,0), (0,1)\}$ ,  $S_2 = \{(1,1), (0,1)\}$  และ  $S_3 = \{(1,2), (2,0)\}$  จงพิจารณาว่า  $S_1, S_2$  และ  $S_3$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^2$  หรือไม่

**วิธีทำ** 1. พิจารณา  $S_1 = \{(1,0), (0,1)\}$

$$\begin{aligned} \text{i) ถ้า } a_1(1,0) + a_2(0,1) &= (0,0) \\ (a_1, a_2) &= (0,0) \end{aligned}$$

$$\text{แล้วจะได้ } a_1 = a_2 = 0$$

ดังนั้น  $S_1$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{ii) } \forall v \in \mathbb{R}^2, v = (v_1, v_2)$$

$$\begin{aligned} \text{ถ้า } (v_1, v_2) &= a_1(1,0) + a_2(0,1) \\ &= (a_1, a_2) \end{aligned}$$

แล้วจะได้  $a_1 = v_1, a_2 = v_2$

นั่นคือ  $(v_1, v_2) = v_1(1,0) + v_2(0,1)$

ดังนั้น  $S_1$  แผ่ทั่ว  $\mathbb{R}^2$

จาก i) และ ii) สรุปว่า  $S_1$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^2$

2. พิจารณา  $S_2 = \{(1,1), (0,1)\}$

i) ถ้า  $a_1(1,1) + a_2(0,1) = (0,0)$

$$(a_1, a_1 + a_2) = (0,0)$$

แล้วจะได้  $a_1 = 0$  และ  $a_1 + a_2 = 0$

กล่าวคือ  $a_1 = a_2 = 0$

ดังนั้น  $S_2$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ii)  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^2, \underline{v} = (v_1, v_2)$

ถ้า  $(v_1, v_2) = a_1(1,1) + a_2(0,1)$

$$= (a_1, a_1 + a_2)$$

แล้วจะได้  $a_1 = v_1, a_2 = v_2 - v_1$

นั่นคือ  $(v_1, v_2) = v_1(1,1) + (v_2 - v_1)(0,1)$

ดังนั้น  $S_2$  แผ่ทั่ว  $\mathbb{R}^2$

จาก i) และ ii) สรุปว่า  $S_2$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^2$

3. พิจารณา  $S_3 = \{(1,2), (2,0)\}$

i) ถ้า  $a_1(1,2) + a_2(2,0) = (0,0)$

$$(a_1 + 2a_2, 2a_1) = (0,0)$$

แล้วจะได้  $2a_1 = 0$  และ  $a_1 + 2a_2 = 0$

กล่าวคือ  $a_1 = a_2 = 0$

ดังนั้น  $S_3$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{ii) } \forall v \in \mathbb{R}^2, v = (v_1, v_2)$$

$$\begin{aligned} \text{ถ้า } (v_1, v_2) &= a_1(1, 2) + a_2(2, 0) \\ &= (a_1 + 2a_2, 2a_1) \end{aligned}$$

$$\text{แล้วจะได้ } a_1 + 2a_2 = v_1 \text{ และ } 2a_1 = v_2$$

$$\text{กล่าวคือ } a_1 = \frac{v_2}{2} \text{ และ } a_2 = \frac{v_1 - a_1}{2} = \frac{2v_1 - v_2}{4}$$

$$\text{นั่นคือ } (v_1, v_2) = \frac{v_2}{2}(1, 2) + \left(\frac{2v_1 - v_2}{4}\right)(2, 0)$$

$$\text{ดังนั้น } S_3 \text{ แผ่ทั่ว } \mathbb{R}^2$$

$$\text{จาก i) และ ii) สรุปว่า } S_3 \text{ เป็นฐานหลักของ } \mathbb{R}^2$$



จากตัวอย่าง 4.1 สรุปได้ว่า  $S_1, S_2$  และ  $S_3$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^2$  ซึ่งจะเห็นว่าฐานหลักของ  $\mathbb{R}^2$  มีหลายเซตด้วยกัน แต่เราจะเรียกฐานหลัก  $S_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$  ว่าเป็นฐานหลักมาตรฐาน (Standard Basis) ของ  $\mathbb{R}^2$

ในทำนองเดียวกัน เราจะได้ว่า  $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  เป็นฐานหลักมาตรฐานของ  $\mathbb{R}^3$  และ  $\{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\}$  เป็นฐานหลักมาตรฐานของ  $\mathbb{R}^n$

**ตัวอย่าง 4.2** ในปริภูมิเวกเตอร์  $P_2$  ให้  $S = \{1, x, x^2\}$  จงแสดงว่า  $S$  เป็นฐานหลักของ  $P_2$

**พิสูจน์** i) จะแสดงว่า  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{สมมติ } a_0 + a_1x + a_2x^2 = 0$$

$$\text{แล้วจะได้ว่า } a_0 = a_1 = a_2 = 0$$

$$\text{ดังนั้น } S \text{ เป็นอิสระเชิงเส้น}$$

ii) จะแสดงว่า  $S$  แผ่ทั่ว  $P_2$

$$\forall p \in P_2, p = c_0 + c_1x + c_2x^2$$

$$\text{ถ้า } c_0 + c_1x + c_2x^2 = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$\text{แล้ว } a_0 = c_0, a_1 = c_1, a_2 = c_2$$

$$\text{ดังนั้น } S \text{ แผ่ทั่ว } P_2$$

$$\text{ฉะนั้น } S \text{ เป็นฐานหลักของ } P_2$$



เราจะเรียก  $S = \{1, x, x^2\}$  เป็นฐานหลักมาตรฐานของ  $P_2$  และ  $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$  เป็นฐานหลักมาตรฐานของ  $P_2$

**ตัวอย่าง 4.3** ในปริภูมิเวกเตอร์  $M_{2 \times 2}$  ให้  $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$  จงแสดงว่า  $S$

เป็นฐานหลักของ  $M_{2 \times 2}$

**พิสูจน์** i) จะแสดงว่า  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{สมมติ } a_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{แล้วจะได้ } a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$$

ดังนั้น  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ii) จะแสดงว่า  $S$  แผ่ทั่ว  $M_{2 \times 2}$

$$\forall \begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}$$

$$\text{ถ้า } \begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{แล้ว } a_1 = s, a_2 = t, a_3 = u, a_4 = v$$

ดังนั้น  $S$  แผ่ทั่ว  $M_{2 \times 2}$

ฉะนั้น  $S$  เป็นฐานหลักของ  $M_{2 \times 2}$



เรียก  $S$  ในตัวอย่าง 4.3 ว่า ฐานหลักมาตรฐานของ  $M_{2 \times 2}$

**ตัวอย่าง 4.4** ให้  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์ของเมทริกซ์มิติ  $2 \times 2$  และ  $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$

จงพิจารณาว่า  $S$  เป็นฐานหลักของ  $V$  หรือไม่

**วิธีทำ** i) ถ้า  $a_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{แล้วจะได้ } a_1 = a_2 = 0$$

ดังนั้น  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{ii) } \forall \begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}$$

$$\text{ถ้า } \begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_1 \end{bmatrix}$$

แล้วจะได้ว่า  $a_1 = s$  และ  $a_1 = v$  ซึ่งเป็นไปไม่ได้

หรือ  $a_2 = t$  และ  $a_2 = u$  ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ดังนั้น  $S$  ไม่แผ่ทั่ว  $M_{2 \times 2}$

ฉะนั้น  $S$  ไม่เป็นฐานหลักของ  $M_{2 \times 2}$

▲

**ตัวอย่าง 4.5** ในปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^3$  ให้  $S = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (1,1,1)\}$  จงพิจารณาว่า  $S$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$  หรือไม่

**วิธีทำ** จะเห็นว่า  $S$  ไม่เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$  เพราะว่า  $S$  ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

กล่าวได้ว่า  $(1,1,1)$  เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$

หรือ  $(1,1,1) = (1,0,0) + (0,1,0) + (0,0,1)$

แม้ว่า  $S$  จะแผ่ทั่ว  $\mathbb{R}^3$  เพราะว่า ถ้า  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

จะได้ว่า  $(x, y, z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)$

▲

**ตัวอย่าง 4.6** จงแสดงว่า  $S = \{x^2 + x, x^2, x^2 + 1\}$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์  $P_2$

**พิสูจน์** i) จะแสดงว่า  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{สมมติ } a_1(x^2 + x), a_2x^2, a_3(x^2 + 1) = 0$$

$$\text{จะได้ } (a_1 + a_2 + a_3)x^2 + a_1x + a_3 = 0$$

$$\text{ดังนั้น } a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$a_1 = 0$$

$$\text{และ } a_3 = 0$$

$$\text{ฉะนั้น } a_1 = a_2 = a_3 = 0$$

ดังนั้น  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ii) จะแสดงว่า  $S$  แผ่ทั่ว  $P_2$

$$p \in P_2, p = c_0 + c_1x + c_2x^2$$

$$\begin{aligned} \text{ถ้า } c_0 + c_1x + c_2x^2 &= a_1(x^2 + x), a_2x^2, a_3(x^2 + 1) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3)x^2 + a_1x + a_3 \end{aligned}$$

$$\text{จะได้ว่า } a_1 + a_2 + a_3 = c_2$$

$$a_1 = c_1$$

$$\text{และ } a_3 = c_0$$

$$\text{ฉะนั้น } a_2 = c_2 - a_1 - a_3 = c_2 - c_1 - c_0$$

ดังนั้น  $S$  แผ่ทั่ว  $P_2$

นั่นคือ  $S$  เป็นฐานหลักของ  $P_2$

▲

**ทฤษฎีบท 4.1** ถ้า  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์  $V$  แล้วแต่ละเวกเตอร์ใน  $V$  จะสามารถเขียนเป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ใน  $S$  ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น

**พิสูจน์** ให้  $v$  เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน  $V$

เนื่องจาก  $S$  เป็นฐานหลักของ  $V$

ดังนั้น  $S$  แผ่ทั่ว  $V$

หรือกล่าวคือ  $v$  เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $v_1, v_2, \dots, v_n$

สมมติ  $a_1, a_2, \dots, a_n$  และ  $b_1, b_2, \dots, b_n$  เป็นสเกลาร์ที่ทำให้

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n$$

(4.1)

$$\text{และ } v = b_1v_1 + b_2v_2 + \dots + b_nv_n$$

(4.2)

$$(4.1) - (4.2): \quad \underline{0} = (a_1 - b_1)v_1 + (a_2 - b_2)v_2 + \dots + (a_n - b_n)v_n$$

แต่  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น จะได้ว่า สำหรับ  $i = 1, 2, 3, \dots, n$

$$a_i - b_i = 0$$

นั่นคือ  $a_i - b_i$  เมื่อ  $i = 1, 2, 3, \dots, n$

ดังนั้น สามารถเขียนแต่ละเวกเตอร์ใน  $V$  ในรูปการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ใน  $S$  ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ▲

**ทฤษฎีบท 4.2** กำหนดให้  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นเซตของเวกเตอร์ที่ไม่มีสมาชิกใดเป็นเวกเตอร์ศูนย์ ถ้า  $S$  แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์  $V$  แล้วจะมีเซตย่อยของ  $S$  เป็นฐานหลักของ  $V$

**พิสูจน์** 1. ถ้า  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น จะได้ว่า  $S$  เป็นฐานหลักของ  $V$  เพราะ  $S$  แผ่ทั่ว  $V$  ตามที่กำหนดให้

2. ถ้า  $S$  ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น จะมีเวกเตอร์  $v_i$  ซึ่งสามารถเขียนในรูปการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์  $v_1, v_2, \dots, v_{i-1}$  สำหรับ  $i$  บางตัวที่มากกว่า 1

นั่นคือ  $v_i = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_{i-1} v_{i-1}$

ให้  $S_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n\}$

ถ้า  $v$  เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน  $V$

แต่  $S$  แผ่ทั่ว  $V$  จะได้ว่า มี  $b_1, b_2, \dots, b_n$  เป็นสเกลาร์ ซึ่ง

$$v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \dots + b_{i-1} v_{i-1} + b_i v_i + b_{i+1} v_{i+1} + \dots + b_n v_n$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } v &= b_1 v_1 + b_2 v_2 + \dots + b_{i-1} v_{i-1} + b_i (a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_{i-1} v_{i-1}) + b_{i+1} v_{i+1} + \dots + b_n v_n \\ &= (b_1 + b_i a_1) v_1 + \dots + (b_{i-1} + b_i a_{i-1}) v_{i-1} + b_{i+1} v_{i+1} + \dots + b_n v_n \end{aligned}$$

ฉะนั้น  $v$  เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $S_1$

ดังนั้น  $S_1$  แผ่ทั่ว  $V$

ถ้า  $S_1$  เป็นอิสระเชิงเส้น แล้ว  $S_1$  เป็นฐานหลักของ  $V$

ถ้า  $S_1$  ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น แล้วต้องสร้าง  $S_2$  โดยจัดเวกเตอร์  $v_k$  ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์  $v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}$  สำหรับ  $k$  บางตัวที่มากกว่า 1

ทำเช่นนี้ต่อไปนี้ เนื่องจาก  $S$  เป็นเซตจำกัด จึงสามารถหาเซต  $T$  ซึ่ง  $T$  เป็นเซตย่อยของ  $S$  และ  $T$  เป็นฐานหลักของ  $V$

▲

ตัวอย่างเช่น กำหนดให้  $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 0, 1), (2, 1, 2)\}$

จะเห็นว่า  $S \subset \mathbb{R}^3$

และ  $S$  แผ่ทั่ว  $\mathbb{R}^3$  เพราะถ้าให้  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  จะได้ว่า

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= a(1, 0, 0) + b(0, 1, 1) + c(1, 0, 1) \\ &= (a + c, b, b + c) \end{aligned}$$

ดังนั้น  $x = a + c$   
 (4.3)

$y = b$   
 (4.4)

และ  $z = b + c$   
 (4.5)

นั่นคือจาก (4.4) จะได้  $b = y$

เมื่อแทน  $b = y$  ใน (4.5) จะได้  $c = z - y$

และแทน  $c = z - y$  ใน (4.3) จะได้  $a = x - z + y$

ฉะนั้น  $(x, y, z) = (x - z + y)(1, 0, 0) + y(0, 1, 1) + (z - y)(1, 0, 1)$

แต่  $S$  ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น เพราะว่า  $(1, 1, 1) = (1, 0, 0) + (0, 1, 1)$

ให้  $S_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 0, 1), (2, 1, 2)\}$

จะเห็นว่า  $S_1$  แผ่ทั่ว  $\mathbb{R}^3$  เช่นเดียวกัน แต่  $S_1$  ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น เพราะว่า

$$(2, 1, 2) = (1, 0, 0) + (0, 1, 1) + (1, 0, 1)$$

ให้  $S_2 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$

จะได้ว่า  $S_2$  แผ่ทั่ว  $\mathbb{R}^3$  และ  $S_2$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น  $S_2$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$

**นิยาม 4.2** ปริภูมิเวกเตอร์  $V$  ที่ไม่ใช่เซตว่าง จะเรียกว่าเป็น **ปริภูมิมิติจำกัด** (finite-dimensional space) เมื่อมีเซตจำกัด  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นฐานหลักของ  $V$  และจะเรียก  $V$  ว่าเป็น **ปริภูมิมิติอนันต์** (infinite-dimensional space) เมื่อไม่มีเซตจำกัดของเวกเตอร์เป็นฐานหลักของ  $V$  สำหรับกรณี  $V = \{0\}$  จะกล่าวว่า  $V$  เป็นปริภูมิจำกัด ถึงแม้ว่า  $\{0\}$  จะไม่มีฐานหลักก็ตาม

ตัวอย่างเช่น ปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^n, P_n, M_{m \times n}$  เป็นปริภูมิมิติจำกัด

**ทฤษฎีบท 4.3** ถ้า  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติจำกัด และมี  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นฐานหลักใด ๆ ของ  $V$  แล้วเซตย่อยจำกัดใด ๆ ของ  $V$  ที่มีสมาชิกมากกว่า  $n$  ตัว จะเป็นเซตไม่อิสระเชิงเส้น

**พิสูจน์** ให้  $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_m\} \subset V$  โดยที่  $m > n$

จะแสดงว่า  $S'$  เป็นเซตไม่อิสระเชิงเส้น



ให้  $a_1, a_2, \dots, a_m$  เป็นสเกลาร์ที่ทำให้

$$a_1 \underline{u}_1 + a_2 \underline{u}_2 + \dots + a_m \underline{u}_m = \underline{0} \quad (4.6)$$

เนื่องจาก  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นฐานหลักของ  $V$

และ  $\underline{u}_i \in V$  สำหรับทุก  $i = 1, 2, \dots, m$

$$\text{ดังนั้น } \underline{u}_1 = c_{11}v_1 + c_{21}v_2 + \dots + c_{n1}v_n$$

$$\underline{u}_2 = c_{12}v_1 + c_{22}v_2 + \dots + c_{n2}v_n$$

$\vdots$

$$\underline{u}_m = c_{1m}v_1 + c_{2m}v_2 + \dots + c_{nm}v_n$$

แทน  $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m$  ใน (4.6) จะได้

$$a_1 (c_{11}v_1 + c_{21}v_2 + \dots + c_{n1}v_n) + a_2 (c_{12}v_1 + c_{22}v_2 + \dots + c_{n2}v_n)$$

$$+ \dots + a_m (c_{1m}v_1 + c_{2m}v_2 + \dots + c_{nm}v_n) = \underline{0}$$

$$(a_1c_{11} + a_2c_{12} + \dots + a_m c_{1m})v_1 + (a_1c_{21} + a_2c_{22} + \dots + a_m c_{2m})v_2$$

$$+ \dots + (a_1c_{n1} + a_2c_{n2} + \dots + a_m c_{nm})v_n = \underline{0}$$

เนื่องจาก  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{ดังนั้น } c_{11}a_1 + c_{12}a_2 + \dots + c_{1m}a_m = 0$$

$$c_{21}a_1 + c_{22}a_2 + \dots + c_{2m}a_m = 0$$

$\vdots$

$$c_{n1}a_1 + c_{n2}a_2 + \dots + c_{nm}a_m = 0$$

$$\text{หรือ } \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1m} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nm} \end{bmatrix}_{n \times m} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}_{m \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

ซึ่งระบบสมการนี้เป็นระบบสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธ์ที่มี  $n$  สมการ  $m$  ตัวแปร และ  $m > n$

ฉะนั้น ระบบสมการมีผลเฉลยมากมาย

นั่นคือ จะมี  $a_1, a_2, \dots, a_m$  บางตัวไม่เท่ากับศูนย์

ดังนั้น  $S'$  เป็นเซตไม่อิสระเชิงเส้น

▲

**ข้อสังเกต** จากทฤษฎีบท 4.3 กำหนดให้  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  และ  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$  ถ้า  $S$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์  $V$  และ  $T \subset V$  และ  $T$  เป็นอิสระเชิงเส้น แล้ว  $m \leq n$

**ทฤษฎีบท 4.4** ถ้า  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มี  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นฐานหลัก แล้วฐานหลักอื่น ๆ ของ  $V$  จะต้องมีส่วนที่มี  $n$  ตัว

**พิสูจน์** ให้  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$  เป็นฐานหลักอื่น ๆ ของ  $V$

จะแสดงว่า  $m = n$

เนื่องจาก  $T$  เป็นฐานหลักของ  $V$

ดังนั้น  $T$  เป็นอิสระเชิงเส้น

จากทฤษฎีบท 4.3 จะได้ว่า  $m \leq n$

ในทำนองเดียวกัน จะได้ว่า  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

จากทฤษฎีบท 4.3 จะได้  $n \leq m$

ดังนั้น  $m = n$

▲

**ข้อสังเกต** จากทฤษฎีบท 4.4 ถ้า  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัด แล้วทุก ๆ ฐานหลักของ  $V$  จะต้องมีส่วนที่มีจำนวนเวกเตอร์เท่ากัน หรือกล่าวคือ ถ้า  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  และ  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์  $V$  แล้ว  $m = n$

**นิยาม 4.3** กำหนดให้  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัด มิติ (dimension) ของ  $V$  เขียนแทนด้วย  $\dim(V)$

หมายถึง จำนวนเวกเตอร์ที่อยู่ในฐานหลักของ  $V$  สำหรับกรณี  $V = \{0\}$  จะนิยาม  $\dim(V) = 0$

ปริภูมิเวกเตอร์ใดมีฐานหลักเป็นเซตจำกัด จะเรียกมิติของปริภูมิเวกเตอร์นั้นว่า **มิติจำกัด** และปริภูมิเวกเตอร์ใดมีฐานหลักเป็นเซตอนันต์ จะเรียกมิติของปริภูมิเวกเตอร์นั้นว่า **มิติอนันต์**

ตัวอย่างเช่น ปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^n, P_n, M_{m \times n}$  เป็นปริภูมิมิติจำกัด จะมีมิติดังต่อไปนี้

1) เนื่องจากฐานหลักของ  $\mathbb{R}^n$  เช่น ฐานหลักมาตรฐานมีเวกเตอร์จำนวน  $n$  ตัว

ดังนั้น  $\dim(\mathbb{R}^n) = n$

2) เนื่องจากฐานหลักของ  $P_n$  เช่น ฐานหลักมาตรฐานมีเวกเตอร์จำนวน  $n+1$  ตัว

ดังนั้น  $\dim(P_n) = n+1$

3) เนื่องจากฐานหลักของ  $M_{m \times n}$  เช่น ฐานหลักมาตรฐานมีเวกเตอร์จำนวน  $mn$  ตัว

ดังนั้น  $\dim(M_{m \times n}) = mn$

**ตัวอย่าง 4.7** กำหนดให้  $S \subset \mathbb{R}^3$  โดย  $S = \{(x, y, z) | x - y + z = 0\}$  จงหา  $\dim(S)$

**วิธีทำ** จากตัวอย่าง 3.10 จะได้ว่า  $S$  เป็นปริภูมิย่อยของ  $\mathbb{R}^3$

$$\text{ให้ } T = \{(1, 1, 0), (1, 0, -1)\}$$

จะแสดงว่า  $T$  เป็นฐานหลักของ  $S$

i) จะแสดงว่า  $T$  เป็นอิสระเชิงเส้น

$$\text{สมมติ } a_1(1, 1, 0) + a_2(1, 0, -1) = (0, 0, 0)$$

$$\text{จะได้ว่า } (a_1 + a_2, a_1, -a_2) = (0, 0, 0)$$

$$\text{ดังนั้น } a_1 + a_2 = 0$$

$$a_1 = 0$$

$$\text{และ } -a_2 = 0$$

$$\text{ฉะนั้น } a_1 = a_2 = 0$$

ดังนั้น  $T$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ii) จะแสดงว่า  $T$  แผ่ทั่ว  $S$

$$\forall \underline{v} \in S, \underline{v} = (x, y, z) \text{ โดยที่ } x - y + z = 0$$

$$\text{ถ้า } (x, y, z) = a_1(1, 1, 0) + a_2(1, 0, -1)$$

$$= (a_1 + a_2, a_1, -a_2)$$

$$\text{แล้วจะได้ } a_1 + a_2 = x, a_1 = y, -a_2 = z$$

$$\text{หรือ } a_1 = y, a_2 = -z = x - y$$

$$\text{นั่นคือ } (x, y, z) = y(1, 1, 0) - z(1, 0, -1)$$

ดังนั้น  $T$  แผ่ทั่ว  $S$

จาก i) และ ii) สรุปว่า  $T$  เป็นฐานหลักของ  $S$

เพราะฉะนั้น  $\dim(S) = 2$



ข้อสังเกต ปริภูมิย่อยของ  $\mathbb{R}^3$  อาจมีมิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ  $\mathbb{R}^3$  ก็ได้

**ตัวอย่าง 4.8** จงหาฐานหลักและมิติของปริภูมิของผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธ์  
ต่อไปนี้

$$2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 0$$

$$-x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 0$$

$$x_3 + x_4 + x_5 = 0$$

วิธีทำ

$$\therefore [A] = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftrightarrow R_3 \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_4 \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow \frac{R_3}{-3} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + 3R_3 \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า  $\text{rank } A = 3$

และ จำนวนตัวแปร = 5

นั่นคือ  $\text{rank } A < \text{จำนวนตัวแปรในระบบ}$

ดังนั้น ระบบสมการมีผลเฉลยมากมาย

จากเมทริกซ์สุดท้าย จะได้

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \\ x_4 &= 0 \end{aligned}$$

ถ้าให้  $x_2 = s$  โดยที่  $s$  เป็นค่าคงตัวที่เป็นจำนวนจริงใด ๆ หรือ  $s \in \mathbb{R}$

และ  $x_5 = t$  โดยที่  $t$  เป็นค่าคงตัวที่เป็นจำนวนจริงใด ๆ หรือ  $t \in \mathbb{R}$

จะได้  $x_3 = -x_4 - x_5 = -0 - t = -t$

และ  $x_1 = -x_2 + 2x_3 + x_5 = -s + 2(-t) + t = -s - t$

$$\text{นั่นคือ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s-t \\ s \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad ; s, t \in \mathbb{R}$$

ให้  $B = \{v_1, v_2\}$

$$\text{โดย} \quad v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

จะพบว่าทุกผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นนี้ จะเป็นการรวมเชิงเส้นของ  $v_1, v_2$  กล่าวคือ ถ้าให้  $W$  เป็นเซตของผลเฉลย แล้ว  $W$  ถูกแผ้วถ้วนโดยเวกเตอร์  $v_1, v_2$  หรือ  $B$  แผ้วถ้วน  $W$  หรือ  $W = \text{span}(B)$  และ  $v_1, v_2$  ไม่เป็นผลคูณสเกลาร์ซึ่งกันและกัน

ดังนั้น  $B$  เป็นอิสระเชิงเส้น

นั่นคือ  $B$  เป็นฐานหลักของ  $W$

ฉะนั้น  $\dim(W) = 2$



**ข้อสังเกต** การที่จะแสดงว่า  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นฐานหลักของ  $V$  จะต้องแสดงว่า  $V = \text{span}(S)$  และ  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น แต่ถ้าทราบว่า  $\dim(V) = n$  ซึ่งเท่ากับจำนวนเวกเตอร์ใน  $S$  ก็จะสามารถหาฐานหลักของ  $V$  ได้สะดวกขึ้น นั่นคือ เพียงแสดงว่า  $V = \text{span}(S)$  หรือ  $S$  เป็นเซตอิสระเชิงเส้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก็เพียงพอ กล่าวคือ ให้  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัด มี  $\dim(V) = n$  และ  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นเซตของเวกเตอร์ใน  $V$  ถ้า  $V = \text{span}(S)$  หรือ  $S$  เป็นเซตอิสระเชิงเส้น แล้ว  $S$  เป็นฐานหลักของ  $V$  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

**ตัวอย่าง 4.9** กำหนด  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นเซตของเวกเตอร์ใน  $\mathbb{R}^3$  โดยที่

$$v_1 = (2, 0, -1), v_2 = (4, 0, 7), v_3 = (-1, 1, 4) \text{ จงแสดงว่า } S \text{ เป็นฐานหลักของ } \mathbb{R}^3$$

**วิธีทำ** เนื่องจาก  $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$  จะเหลือเพียงแสดงว่า  $S$  เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

พิจารณา  $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$  เมื่อ  $a_1, a_2, a_3$  เป็นสเกลาร์ จะได้

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 7 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{เพราะว่า } \begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 7 & 4 \end{vmatrix} &= 0 + 0 + 1(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} \\ &= (-1)(14 + 4) \\ &= -18 \neq 0 \end{aligned}$$

ดังนั้น ระบบสมการจะมีผลเฉลยเพียงชุดเดียว คือ  $a_1 = a_2 = a_3 = 0$

นั่นคือ  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ฉะนั้น  $S$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$



**ทฤษฎีบท 4.5** กำหนดให้  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นเซตย่อยของปริภูมิเวกเตอร์  $V$  ถ้า  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น และ  $\dim(V) = m$  แล้วจะมีเวกเตอร์  $w_1, w_2, \dots, w_{m-n}$  ใน  $V$  ที่

$$T = \{v_1, v_2, \dots, v_n, w_1, w_2, \dots, w_{m-n}\}$$

เป็นฐานหลักของ  $V$

**พิสูจน์** ให้  $B = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$  เป็นฐานหลักของ  $V$

และให้  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n, w_1, w_2, \dots, w_{m-n}\}$

เพราะว่า  $B \subset S_1$  และ  $B$  แผ่ทั่ว  $V$

ดังนั้น  $S_1$  แผ่ทั่ว  $V$  และ  $0 \notin S_1$

โดยทฤษฎีบท 4.2 จะมีฐานหลัก  $T$  โดยที่  $T \subset S_1$

สำหรับการหา  $T$  นั้นเรามีวิธีหาโดยการตัดเวกเตอร์ใน  $S_1$  ที่เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ข้างหน้าออก แต่เนื่องจาก  $S$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น จะไม่มี  $v_i$  ใดเป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์อื่น ๆ

นั่นคือ เวกเตอร์  $v_i$  ทั้งหมดจึงไม่ถูกตัดออก จะได้ว่า  $S \subset T$

ฉะนั้น  $T = \{v_1, v_2, \dots, v_n, w_1, w_2, \dots, w_{m-n}\}$

▲

**ข้อสังเกต** 1. ถ้า  $\dim(V) = n$  แล้วฐานหลักของ  $V$  จะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นอิสระเชิงเส้น และเซตนี้จะมีสมาชิก  $n$  เวกเตอร์ และฐานหลักของ  $V$  เป็นเซตที่เล็กที่สุดที่แผ่ทั่ว  $V$

2. ถ้า  $\dim(V) = n$  แล้วเซตย่อยของ  $V$  ที่มีจำนวนสมาชิกมากกว่า  $n$  จะไม่เป็นอิสระเชิงเส้น และเซตย่อยของ  $V$  ที่มีจำนวนสมานชิกน้อยกว่า  $n$  จะไม่แผ่ทั่ว  $V$

**ตัวอย่าง 4.10** จงหาฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$  โดยที่ฐานหลักนี้มี  $v = (0, 1, 1)$  เป็นสมาชิก

**วิธีทำ** ให้  $v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (0, 0, 1)$

เนื่องจาก  $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  เป็นฐานหลักมาตรฐานของ  $\mathbb{R}^3$

ต่อไปจะพิจารณาว่า  $(1, 0, 0)$  เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $(0, 1, 1)$  หรือไม่

เนื่องจาก  $(1, 0, 0) = a_1(0, 1, 1)$

นั่นคือ  $(1, 0, 0) = (0, a_1, a_1)$

ดังนั้น  $a_1 = 0$

และ  $0 = 1$  ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ฉะนั้น  $(1, 0, 0)$  ไม่เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $(0, 1, 1)$

นั่นคือ  $\{(0, 1, 1), (1, 0, 0)\}$  เป็นอิสระเชิงเส้น

ถัดไปจะพิจารณาว่า  $(0,1,0)$  เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $(0,1,1)$  และ  $(1,0,0)$  หรือไม่

เนื่องจาก  $(0,1,0) = a_1(0,1,1) + a_2(1,0,0)$

นั่นคือ  $(0,1,0) = (a_1, a_2, a_3)$

ดังนั้น  $a_2 = 0$

$a_1 = 1$

และ  $a_3 = 0$  ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ฉะนั้น  $(0,1,0)$  ไม่เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $(0,1,1)$  และ  $(1,0,0)$

นั่นคือ  $\{(0,1,1), (1,0,0), (0,1,0)\}$  เป็นอิสระเชิงเส้น

สุดท้ายจะพิจารณาว่า  $(0,0,1)$  เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $(0,1,1), (1,0,0)$  และ  $(0,1,0)$  หรือไม่

เนื่องจาก  $(0,0,1) = a_1(0,1,1) + a_2(1,0,0) + a_3(0,1,0)$

นั่นคือ  $(0,0,1) = (a_2, a_1 + a_3, a_1)$

ดังนั้น  $a_1 = 1$

$a_2 = 0$

และ  $a_3 = -1$

ฉะนั้น  $(0,0,1)$  เป็นการรวมเชิงเส้นของ  $(0,1,1), (1,0,0)$  และ  $(0,1,0)$

นั่นคือ  $(0,0,1)$  จึงไม่อยู่ในฐานหลัก

ให้  $S_1 = \{(0,1,1), (1,0,0), (0,1,0)\}$

จะได้ว่า  $S_1$  แผ่ทั่ว  $\mathbb{R}^3$  และเป็นอิสระเชิงเส้น

นั่นคือ  $S_1$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$

▲

**ข้อสังเกต** หลักในการหาฐานหลัก  $S$  ของ  $V$  ที่ง่ายและสะดวกที่สุด คือ การเริ่มจากฐานหลักมาตรฐาน โดยเพิ่มเวกเตอร์จากฐานหลักมาตรฐานนี้เข้าไปใน  $S$  และจำนวนเวกเตอร์ที่จะเป็นฐานหลักนี้ เราทราบจากมิติของ  $V$  กล่าวคือ  $\dim(V)$  จะต้องเท่ากับจำนวนสมาชิกของ  $S$  ที่เป็นฐานหลักของ  $V$



## 4.2 ปริภูมิเวกเตอร์แถวและปริภูมิเวกเตอร์หลักของเมทริกซ์

### (Row Vector Space and Column Vector Space of a Matrix)

นิยาม 4.4 ให้  $A$  เป็นเมทริกซ์มิติ  $m \times n$  ซึ่ง  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$

เวกเตอร์  $v_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), v_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, v_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$  ซึ่งเป็นสมาชิกในแถวที่ 1 ถึงแถวที่  $m$  ของ  $A$  จะเรียกว่า เวกเตอร์แถว (Row Vectors) ของ  $A$  และเวกเตอร์

$c_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, c_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$  ซึ่งเป็นสมาชิกในหลักที่ 1 ถึงแถวที่  $n$  ของ  $A$  จะเรียก

เวกเตอร์หลัก (Column Vectors)

ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  (Row Vectors Space of  $A$ ) คือ ปริภูมิย่อยของ  $\mathbb{R}^n$  ซึ่งแผ่ทั่วโดย  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  และปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$  (Column Vectors Space of  $A$ ) คือ ปริภูมิย่อยของ  $\mathbb{R}^m$  ซึ่งแผ่ทั่วโดย  $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$

ตัวอย่างเช่น ให้  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  จะได้ว่า

เวกเตอร์แถวของ  $A$  คือ  $v_1 = (1, 3), v_2 = (2, -1), v_3 = (5, 0)$  และ  $v_4 = (1, 2)$

เวกเตอร์หลักของ  $A$  คือ  $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$  และ  $c_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  คือ ปริภูมีย่อยของ  $\mathbb{R}^2$  ซึ่งแผ่ทั่วโดย  $\{(1,3), (2,-1), (5,0), (1,2)\}$

ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$  คือ ปริภูมีย่อยของ  $\mathbb{R}^4$  ซึ่งแผ่ทั่วโดย  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

**ทฤษฎีบท 4.6** ถ้าเมทริกซ์  $A$  สมมูลตามแถวกับ  $B$  แล้วปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  เท่ากับปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $B$

**พิสูจน์** ให้  $A$  สมมูลตามแถวกับ  $B$

ดังนั้น แต่ละแถวของ  $B$  เกิดจากเมทริกซ์  $A$  โดยการดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน จะได้ว่าแต่ละแถวของ  $B$  เป็นการรวมเชิงเส้นของแถวของ  $A$

นั่นคือ ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $B$  เป็นเซตย่อยของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$

และถ้าใช้การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานผกผันที่ใช้อย่างต้นในลำดับย้อนกลับกระทำกับแถวของ

เมทริกซ์  $B$  จะได้เมทริกซ์  $A$

ฉะนั้น ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  เป็นเซตย่อยของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $B$

สรุปได้ว่า ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  เท่ากับปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $B$

▲

ในทำนองเดียวกัน จากทฤษฎีบท 4.6 ถ้าเมทริกซ์  $A$  สมมูลตามหลักกับ  $B$  แล้วปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$  เท่ากับปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $B$

และผลจากทฤษฎีบทนี้ จะใช้ในการหาฐานหลักของปริภูมีย่อยซึ่งแผ่ทั่วโดยเซตของเวกเตอร์ นั่นคือ เวกเตอร์แถวที่ไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ในเมทริกซ์ชั้นบันไดของเมทริกซ์  $A$  จะเป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  ดังนี้ตัวอย่างต่อไปนี้

**ตัวอย่าง 4.11** ให้  $V$  เป็นปริภูมีย่อยของ  $\mathbb{R}^4$  ซึ่งแผ่ทั่วโดย  $S = \{\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_3, \underline{a}_4, \underline{a}_5\}$

เมื่อ  $\underline{a}_1 = (1, 1, 0, 2), \underline{a}_2 = (0, 1, 4, 1), \underline{a}_3 = (2, 2, 1, -1), \underline{a}_4 = (1, 1, 1, -3)$  และ  $\underline{a}_5 = (0, 1, 5, -4)$

จงหาฐานหลักของ  $V$

**วิธีทำ** ให้  $V$  ปริภูมิเวกเตอร์แถวของเมทริกซ์  $A$  ซึ่ง

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 5 & -4 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \\ \sim \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 5 & -4 \end{bmatrix} \\
 & \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \\ \sim \\ R_5 \rightarrow R_5 - R_2 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} \\
 & \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 + 4R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 - 4R_3 \\ \sim \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_3 \\ R_5 \rightarrow R_5 - R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -19 \\ 0 & 1 & 0 & 21 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B
 \end{aligned}$$

ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  และปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $B$  เป็นปริภูมิเดียวกัน แต่ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $B$  มี  $\{(1,0,0,-19), (0,1,0,21), (0,0,1,-5)\}$  เป็นฐานหลัก

ดังนั้น ฐานหลักของ  $V$  คือ  $(1,0,0,-19), (0,1,0,21), (0,0,1,-5)$

▲

จากตัวอย่างนี้ จะพบว่า สามารถใช้การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานเพื่อหาฐานหลักของปริภูมิย่อยที่แผ่ทั่วโดยเซตของเวกเตอร์ที่กำหนดให้

นอกจากนี้ การเขียนเวกเตอร์แถวจะนิยมเขียนในแนวนอน และเวกเตอร์หลักจะนิยมเขียนในแนวตั้ง ซึ่งเวกเตอร์แถวอาจจะเขียนในแนวตั้ง และเวกเตอร์หลักอาจจะเขียนในแนวนอนก็ได้ และจากข้อสังเกตนี้จะเห็นว่า การเปลี่ยนจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอน ปริภูมิเวกเตอร์หลักของเมทริกซ์ก็ยังคงเหมือนกับปริภูมิเวกเตอร์แถวของเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของเมทริกซ์นั้น ดังนั้น จะสามารถหาฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์หลักของเมทริกซ์  $A$  โดยการหาฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A'$  และเขียนกลับในแนวตั้ง

**ตัวอย่าง 4.12** จงหาฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์หลักของเมทริกซ์  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$

วิธีทำ เพราะว่า  $A' = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \\ \sim \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow \frac{R_2}{2} \\ \sim \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2 \\ \sim \\ R_4 \rightarrow R_4 + 2R_2 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น  $(1, 0, -6)$  และ  $(0, 1, 2)$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A'$  หรือ  $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$  และ

$c_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$  จะเป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$

▲

**ทฤษฎีบท 4.7** ให้  $A$  เป็นเมทริกซ์มิติ  $m \times n$  ใด ๆ แล้วปริภูมิเวกเตอร์แถวและปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$  จะมีมิติเดียวกัน

พิสูจน์ ให้เวกเตอร์แถวของ  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$  แทนด้วย  $v_1, v_2, \dots, v_m$  โดย

$$v_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$v_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$$

⋮

$$v_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

สมมติว่าปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  มีมิติเป็น  $k$  และ  $S = \{\underline{b}_1, \underline{b}_2, \dots, \underline{b}_k\}$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์แถว โดยที่  $\underline{b}_i = \{b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in}\}$

เนื่องจาก  $S$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์แถว

ดังนั้น จะได้ว่า สมาชิกทุกตัวของปริภูมิเวกเตอร์แถวจะเป็นการรวมเชิงเส้นของ  $\underline{b}_1, \underline{b}_2, \dots, \underline{b}_k$  ดังนี้

$$\left. \begin{aligned} \underline{r}_1 &= c_{11}\underline{b}_1 + c_{12}\underline{b}_2 + \cdots + c_{1k}\underline{b}_k \\ \underline{r}_2 &= c_{21}\underline{b}_1 + c_{22}\underline{b}_2 + \cdots + c_{2k}\underline{b}_k \\ &\vdots \\ \underline{r}_m &= c_{m1}\underline{b}_1 + c_{m2}\underline{b}_2 + \cdots + c_{mk}\underline{b}_k \end{aligned} \right\}$$

และเวกเตอร์สองเวกเตอร์ใด ๆ ใน  $\mathbb{R}^n$  เท่ากันก็ต่อเมื่อส่วนประกอบที่สมนัยกันจะต้องเท่ากัน นั่นคือ ส่วนประกอบที่  $j$  ของ (4.7) จะเท่ากัน ดังนี้

$$\begin{aligned} a_{1j} &= c_{11}b_{1j} + c_{12}b_{2j} + \cdots + c_{1k}b_{kj} \\ a_{2j} &= c_{21}b_{1j} + c_{22}b_{2j} + \cdots + c_{2k}b_{kj} \\ &\vdots \\ a_{mj} &= c_{m1}b_{1j} + c_{m2}b_{2j} + \cdots + c_{mk}b_{kj} \end{aligned}$$

$$\text{หรือ } \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} = b_{1j} \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{bmatrix} + b_{2j} \begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + b_{kj} \begin{bmatrix} c_{1k} \\ c_{2k} \\ \vdots \\ c_{mk} \end{bmatrix}$$

(4.8)

ซึ่งทางซ้ายของ (4.8) จะเป็นหลักที่  $j$  ของ  $A$  และ  $j=1,2,\dots,n$  เป็นค่าคงตัวใด ๆ ดังนั้น แต่ละเวกเตอร์หลักของ  $A$  จะอยู่ในปริภูมิที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ทางขวาของ (4.8) ฉะนั้น ปริภูมิเวกเตอร์หลักจะมีมิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ  $k$

เนื่องจาก  $k = \dim$  (ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$ ) จะได้

$$\dim$$
 (ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$ )  $\leq$   $\dim$  (ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$ )

(4.9)

ในทำนองเดียวกัน

$$\dim$$
 (ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A'$ )  $\leq$   $\dim$  (ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A'$ )

(4.10)

แต่การสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ คือ การเปลี่ยนหลักของเมทริกซ์ให้เป็นแถว และเปลี่ยนแถวให้เป็นหลัก ดังนั้น ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A' =$  ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$

และ ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A' =$  ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$

ซึ่งสามารถเขียน (4.10) ได้ดังนี้

$$\dim$$
 (ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$ )  $\leq$   $\dim$  (ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$ )

(4.11)

จาก (4.9) และ (4.11) สรุปได้ว่า

$$\dim$$
 (ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$ )  $=$   $\dim$  (ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$ )



**ตัวอย่าง 4.13** จงหามิติของปริภูมิเวกเตอร์หลักและปริภูมิเวกเตอร์แถวของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

วิธีทำ เพราะว่า  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น  $(1,0,1,1)$  และ  $(0,1,1,-1)$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$

ฉะนั้น มิติของปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  เท่ากับ 2

และจากทฤษฎีบท 4.7 จะได้ว่า มิติของปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$  เป็น 2



จากตัวอย่างนี้ จะพบว่า เมื่อใช้การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานกระทำกับเมทริกซ์  $A$  จนเป็นเมทริกซ์ขั้นบันได จะได้ว่า มีจำนวนแถวที่ไม่เป็นศูนย์หมด 2 แถว ดังนั้น มิติของปริภูมิเวกเตอร์แถว จะเป็น 2 ซึ่งจะทำให้นิยามค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์  $A$  ได้ตั้งนิยามต่อไปนี้

**นิยาม 4.5** มิติของปริภูมิเวกเตอร์แถวและปริภูมิเวกเตอร์หลักของเมทริกซ์  $A$  จะเรียกว่า **ค่าลำดับชั้น** ของ  $A$

$$\text{นั่นคือ } \text{rank } A = \dim(\text{ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ } A) = \dim(\text{ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ } A)$$

**ทฤษฎีบท 4.8** ถ้า  $A$  เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ  $n$  แล้วข้อความต่อไปนี้จะสมมูลกัน

1.  $A$  จะหาตัวผกผันได้
2.  $AX = \underline{0}$  จะมีผลเฉลยชัด

3.  $A$  จะสมมูลตามแถวกับ  $I_n$
4.  $AX = B$  เป็นระบบที่มีผลเฉลย เมื่อ  $B$  เป็นเมทริกซ์มิติ  $n \times 1$
5.  $\det A \neq 0$
6.  $A$  มีค่าลำดับชั้นเท่ากับ  $n$
7. เวกเตอร์แถวของ  $A$  จะเป็นอิสระเชิงเส้น
8. เวกเตอร์แถวของ  $A$  จะเป็นอิสระเชิงเส้น

**พิสูจน์** เห็นชัดว่า 3 สมมูลกับ 1,2,4 และ 5

จะแสดงว่า 3,6,7 และ 8 สมมูลกัน

เริ่มจาก จะพิสูจน์ว่า  $3 \rightarrow 6$

ให้  $A$  สมมูลตามแถวกับ  $I_n$  และเนื่องจาก  $I_n$  มีจำนวนแถวที่ไม่เป็นศูนย์หมด  $n$  แถว จะได้  
 ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  จะมีมิติเท่ากับ  $n$

ดังนั้น  $A$  มีค่าลำดับชั้นเป็น  $n$

ต่อไปจะพิสูจน์ว่า  $6 \rightarrow 7$

ให้  $A$  มีลำดับชั้นเป็น  $n$

จะได้ว่า ปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  จะมีมิติเท่ากับ  $n$

และเวกเตอร์แถว  $n$  เวกเตอร์ของ  $A$  ทั่วปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$

ดังนั้น เวกเตอร์หลักของ  $A$  จะเป็นอิสระเชิงเส้น

ถัดไป จะพิสูจน์ว่า  $7 \rightarrow 8$

ให้เวกเตอร์แถวของ  $A$  เป็นอิสระเชิงเส้น

จะได้ว่า ปริภูมิเวกเตอร์แถวและปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$  จะมีมิติเท่ากับ  $n$

และเนื่องจากเวกเตอร์หลักของ  $A$  ทั่วปริภูมิเวกเตอร์หลัก

ดังนั้น เวกเตอร์หลักของ  $A$  จะเป็นอิสระเชิงเส้น

สุดท้าย จะพิสูจน์ว่า  $8 \rightarrow 3$

ให้เวกเตอร์หลักของ  $A$  เป็นอิสระเชิงเส้น

จะได้ว่า ปริภูมิเวกเตอร์หลักของ  $A$  จะมีมิติ  $n$  และปริภูมิเวกเตอร์แถวของ  $A$  จะมีมิติ  $n$  ด้วย

นั่นคือ เมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูปตามแถวของ  $A$  จะมีจำนวนแถวที่ไม่เป็นศูนย์หมด  $n$  แถว

กล่าวคือ เมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูปตามแถวของ  $A$  จะเป็น  $I_n$

ดังนั้น  $A$  จะสมมูลตามแถวกับ  $I_n$



พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m &= b_n \end{aligned}$$

สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้เป็น

$$AX = B$$

โดยที่  $A$  เป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในระบบสมการ

$B$  เป็นเมทริกซ์ของค่าคงที่ในระบบสมการ

และ  $X$  เป็นเมทริกซ์ของตัวแปรในระบบสมการ

หรือเขียนแทนด้วย

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

หรือ  $x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + x_m \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$

นั่นคือ  $AX = x_1c_1 + x_2c_2 + \cdots + x_m c_m$

เมื่อ  $c_1, c_2, \dots, c_m$  ปริภูมิเวกเตอร์หลักของเมทริกซ์  $A$

และ  $x_i; i = 1, 2, \dots, m$  เป็นตัวแปรในระบบสมการ

จากสมการข้างต้น จะได้ว่าผลคูณ  $AX$  เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์หลักของ  $A$  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้

**ทฤษฎีบท 4.9** ระบบสมการเชิงเส้น  $AX = B$  จะมีผลเฉลย ก็ต่อเมื่อ  $B$  เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์หลักของ  $A$

**พิสูจน์** ให้  $AX = B$  เป็นระบบสมการ

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m &= b_n \end{aligned}$$



1. ให้  $AX = B$  มีผลเฉลย

$$\text{และสมมติ } X' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_m \end{bmatrix} \text{ เป็นผลเฉลยของ } AX = B$$

จะได้ว่า  $AX' = B$

$$\text{หรือ } B = x'_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + x'_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + x'_m \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{bmatrix}$$

ดังนั้น  $B$  เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์หลักของ  $A$

2. ให้  $B$  เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์หลักของ  $A$

ฉะนั้น จะมีสเกลาร์  $x'_1, x'_2, \dots, x'_m$  ที่ทำให้

$$B = x'_1 c_1 + x'_2 c_2 + \cdots + x'_m c_m$$

เมื่อ  $c_1 + c_2 + \cdots + c_m$  เป็นเวกเตอร์หลักของเมทริกซ์  $A$

$$\text{นั่นคือ } B = x'_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + x'_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + x'_m \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{bmatrix}$$

ดังนั้น ระบบสมการเชิงเส้น  $AX = B$  มีผลเฉลย

▲

ตัวอย่างเช่น กำหนดให้  $-x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1$

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -9$$

$$2x_1 + x_2 - 2x_3 = -3$$

หรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูป  $AX = B$  ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ -3 \end{bmatrix}$$

จากการแก้ระบบสมการ จะได้ว่า ผลเฉลยเป็น  $x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 3$

ดังนั้น ผลคูณของเมทริกซ์  $\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$  สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการรวมเชิงเส้นของ

เวกเตอร์หลักของ  $A$  ได้ดังนี้

$$2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ -3 \end{bmatrix}$$

#### 4.3 เวกเตอร์พิกัดและเมทริกซ์พิกัด (Coordinate Vector and Coordinate Matrix)

**นิยาม 4.6** ถ้า  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์  $V$  และ  $v \in V$  สมมติ

$c_1, c_2, \dots, c_n$

เป็นสเกลาร์ที่ทำให้  $v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$  เวกเตอร์พิกัดของ  $v$  เทียบกับฐานหลัก  $S$

(Coordinate Vector of  $v$  with respect to the ordered basis  $S$ ) จะเขียนแทนด้วย  $(v)_S$  ซึ่งนิยาม

$(v)_S = (c_1, c_2, \dots, c_n)$  โดยเรียกสมาชิกของ  $(v)_S$  ว่า พิกัดของ  $v$  เมื่อเทียบกับ  $S$  (Coordinates of

$v$  with respect to  $S$ ) และ เมทริกซ์พิกัด (Coordinate matrix) ของ  $v$  เทียบกับฐานหลัก  $S$  จะเขียน

แทนด้วย  $(v)_S$  จะเป็นเมทริกซ์  $n \times 1$  ซึ่งเท่ากับ  $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$

**ตัวอย่าง 4.14** ในปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^3$  กำหนดให้  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$  เป็นฐานหลัก โดยที่

$$(v)_1 = (1, 2, 1), (v)_2 = (2, 9, 0), (v)_3 = (3, 3, 4)$$

1) จงหาเวกเตอร์พิกัดและเมทริกซ์พิกัดของ  $v = (5, -1, 9)$  เทียบกับฐานหลัก  $S$

2) จงหาเวกเตอร์  $v$  ใน  $\mathbb{R}^3$  ที่มีเวกเตอร์พิกัดเท่ากับฐานหลัก  $S$  คือ  $(v)_S = (-1, 3, 2)$

**วิธีทำ** 1) พิจารณา  $v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3$  เมื่อ  $c_1, c_2, c_3$  เป็นสเกลาร์ จะได้

$$(5, -1, 9) = c_1 (1, 2, 1) + c_2 (2, 9, 0) + c_3 (3, 3, 4)$$

$$\text{หรือ } c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 5$$

$$2c_1 + 9c_2 + 3c_3 = -1$$

$$\text{และ } c_1 + 4c_3 = 9$$

แก้ระบบสมการเชิงเส้นหาค่าของ  $c_1, c_2, c_3$  โดยจะได้ผลเฉลย  $c_1 = 1, c_2 = -1, c_3 = 2$

ดังนั้น เวกเตอร์พิกัดของ  $v = (5, -1, 9)$  เทียบกับฐานหลัก  $S$  คือ  $(v)_S = (1, -1, 2)$

และเมทริกซ์พิกัดของ  $\underline{v} = (5, -1, 9)$  เทียบกับฐานหลัก  $S$  คือ  $[\underline{v}]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

2) เนื่องจากเวกเตอร์พิกัดของ  $\underline{v}$  เทียบกับฐานหลัก  $S$  คือ  $(\underline{v})_S = (-1, 3, 2)$  จะได้

$$\begin{aligned} \underline{v} &= (-1)v_1 + 3v_2 + 2v_3 \\ &= (-1)(1, 2, 1) + 3(2, 9, 0) + 2(3, 3, 4) \\ &= (11, 31, 7) \end{aligned}$$

▲

**ตัวอย่าง 4.15** ในปริภูมิเวกเตอร์  $P_2$  กำหนดให้  $S = \{1, x, x^2\}$  เป็นฐานหลัก จงหาเวกเตอร์พิกัดและเมทริกซ์พิกัดของ  $\underline{P} = a_0 + a_1x + a_2x^2$

**วิธีทำ** เนื่องจาก  $S = \{1, x, x^2\}$  เป็นฐานหลักมาตรฐานหลักของ  $P_2$

และกำหนดให้  $\underline{P} = a_0 + a_1x + a_2x^2$  จะได้ เวกเตอร์พิกัดและเมทริกซ์พิกัดของ  $\underline{P}$  เทียบกับฐานหลัก  $S$  คือ

$$(\underline{p})_S = (a_0, a_1, a_2) \text{ และ } [\underline{p}]_S = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \text{ ตามลำดับ}$$

▲

**ตัวอย่าง 4.16** ในปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^3$  ให้  $S_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  และ

$S_2 = \{(0, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$  จงหาเมทริกซ์พิกัดของ  $\underline{v} = (2, 3, 4)$  เทียบกับ  $S_1$  และ  $S_2$

**วิธีทำ** จะเห็นว่า  $S_1$  เป็นฐานหลักมาตรฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$

พิจารณา  $(2, 3, 4) = c_1(1, 0, 0) + c_2(0, 1, 0) + c_3(0, 0, 1)$  เมื่อ  $c_1, c_2, c_3$  เป็นสเกลาร์

จะได้  $c_1 = 2, c_2 = 3, c_3 = 4$

นั่นคือ  $(2, 3, 4) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 4(0, 0, 1)$

$$\text{ดังนั้น } [\underline{v}]_{S_1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

จากตัวอย่าง 4.10 จะเห็นว่า  $S_2$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$

พิจารณา  $(2, 3, 4) = c_1(0, 1, 1) + c_2(1, 0, 0) + c_3(0, 1, 0)$  เมื่อ  $c_1, c_2, c_3$  เป็นสเกลาร์

จะได้  $c_1 = 4, c_2 = 2, c_3 = -1$

$$\text{ดังนั้น } [v]_{S_2} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$



จากตัวอย่างที่ 4.16 จะเห็นว่า เวกเตอร์  $v$  เดียวกันแต่คนละฐานหลักจะมีพิกัดที่แตกต่างกัน

#### 4.4 การเปลี่ยนฐานหลัก (Change of Basis)

เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนฐานหลัก จะเริ่มต้นจาก ให้  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์ โดยมี

$$B = \{\underline{u}_1, \underline{u}_2\} \text{ และ } B' = \{\underline{u}'_1, \underline{u}'_2\} \text{ เป็นฐานหลัก}$$

$$\text{สมมติว่า } [\underline{u}'_1]_B = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \text{ และ } [\underline{u}'_2]_B = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

$$\text{จะได้ } \underline{u}'_1 = a\underline{u}_1 + b\underline{u}_2 \text{ และ } \underline{u}'_2 = c\underline{u}_1 + d\underline{u}_2$$

กำหนดให้  $v$  เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน  $V$  โดย  $[v]_{B'} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$  เป็นเมทริกซ์พิกัดเทียบกับฐานหลักใหม่

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } v &= k_1 \underline{u}'_1 + k_2 \underline{u}'_2 \\ &= k_1 (a\underline{u}_1 + b\underline{u}_2) + k_2 (c\underline{u}_1 + d\underline{u}_2) \\ &= (k_1 a + k_2 c) \underline{u}_1 + (k_1 b + k_2 d) \underline{u}_2 \end{aligned}$$

ดังนั้น เมทริกซ์พิกัดเทียบกับฐานหลักเก่า  $B$  ของ  $v$  คือ

$$\begin{aligned} [v]_B &= \begin{bmatrix} k_1 a + k_2 c \\ k_1 b + k_2 d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} [v]_{B'} \\ &= \left[ [\underline{u}'_1]_B, [\underline{u}'_2]_B \right] [v]_{B'} \\ &= P [v]_{B'} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ } P &= \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \\ &= \left[ [\underline{u}'_1]_B, [\underline{u}'_2]_B \right] \end{aligned}$$

ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นวิธีการหาเมทริกซ์พิกัดสำหรับฐานหลักใหม่  $B'$  เทียบกับฐานหลักเก่า  $B$  เมื่อปริภูมิเวกเตอร์  $V$  มีมิติ 2 แล้วจึงพัฒนาแนวคิดไปสู่กรณีทั่วไป สำหรับปริภูมิเวกเตอร์  $V$  ที่มี

มิติ  $n$  ในทำนองเดียวกัน จะได้ว่าเมทริกซ์พิกัดเทียบกับฐานหลักเก่า  $B' = \{\underline{u}'_1, \underline{u}'_2, \dots, \underline{u}'_n\}$  กับเมทริกซ์  $P$  กล่าวคือ  $[\underline{v}]_B = P[\underline{v}]_{B'}$  โดยหลักของเมทริกซ์  $P$  เป็นเมทริกซ์พิกัดของเวกเตอร์ในฐานหลัก

ใหม่เทียบกับฐานหลักเก่า นั่นคือ เวกเตอร์หลักของ  $P$  คือ  $[\underline{u}'_1]_B, [\underline{u}'_2]_B, \dots, [\underline{u}'_n]_B$  หรือ

$$P = \left[ [\underline{u}'_1]_B, [\underline{u}'_2]_B, \dots, [\underline{u}'_n]_B \right] \text{ เรียกเมทริกซ์ } P \text{ ว่า เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะ (Transition Matrix)}$$

จาก  $B'$  ไป  $B$  เขียนแทนด้วย  ${}_B A_{B'}$  ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ดังทฤษฎีต่อไปนี้

**ทฤษฎีบท 4.10** ให้  $\underline{v}$  เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ในปริภูมิเวกเตอร์  $V$  ถ้า  $P$  เป็นเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจากฐานหลัก  $B = \{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_n\}$  ไป  $B' = \{\underline{u}'_1, \underline{u}'_2, \dots, \underline{u}'_n\}$  แล้ว  $[\underline{v}]_B = P[\underline{v}]_{B'}$

พิสูจน์ ให้  $V$  เป็นปริภูมิเวกเตอร์ โดยมี  $B = \{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_n\}$  และ  $B' = \{\underline{u}'_1, \underline{u}'_2, \dots, \underline{u}'_n\}$  เป็นฐานหลัก

$$\text{สมมติ } [\underline{u}'_1]_B = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1n} \end{bmatrix}, [\underline{u}'_2]_B = \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{2n} \end{bmatrix}, \dots, [\underline{u}'_n]_B = \begin{bmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{bmatrix}$$

$$\text{จะได้ } \underline{u}'_1 = a_{11}\underline{u}_1 + a_{12}\underline{u}_2 + \dots + a_{1n}\underline{u}_n$$

$$\underline{u}'_2 = a_{21}\underline{u}_1 + a_{22}\underline{u}_2 + \dots + a_{2n}\underline{u}_n$$

$$\vdots$$

$$\text{และ } \underline{u}'_n = a_{n1}\underline{u}_1 + a_{n2}\underline{u}_2 + \dots + a_{nm}\underline{u}_n$$

$$\text{กำหนดให้ } \underline{v} \text{ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน } V \text{ โดย } [\underline{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} \text{ เป็นเมทริกซ์พิกัดเทียบกับฐานหลัก } B'$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } \underline{v} &= k_1\underline{u}'_1 + k_2\underline{u}'_2 + \dots + k_n\underline{u}'_n \\ &= k_1(a_{11}\underline{u}_1 + a_{12}\underline{u}_2 + \dots + a_{1n}\underline{u}_n) + k_2(a_{21}\underline{u}_1 + a_{22}\underline{u}_2 + \dots + a_{2n}\underline{u}_n) \\ &\quad + \dots + k_n(a_{n1}\underline{u}_1 + a_{n2}\underline{u}_2 + \dots + a_{nm}\underline{u}_n) \\ &= (k_1a_{11} + k_2a_{21} + \dots + k_na_{n1})\underline{u}_1 + (k_1a_{12} + k_2a_{22} + \dots + k_na_{n2})\underline{u}_2 \\ &\quad + \dots + (k_1a_{1n} + k_2a_{2n} + \dots + k_na_{nm})\underline{u}_n \end{aligned}$$

ดังนั้น เมทริกซ์พิกัดเทียบกับฐานหลัก  $B$  ของ  $\underline{v}$  คือ

$$\begin{aligned}
[\underline{y}]_B &= \begin{bmatrix} k_1 a_{11} + k_2 a_{21} + \cdots + k_n a_{n1} \\ k_1 a_{12} + k_2 a_{22} + \cdots + k_n a_{n2} \\ \vdots \\ k_1 a_{1n} + k_2 a_{2n} + \cdots + k_n a_{nn} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} [\underline{y}]_{B'} \\
&= \left[ \left[ \underline{u}'_1 \right]_B, \left[ \underline{u}'_2 \right]_B, \dots, \left[ \underline{u}'_n \right]_B \right] [\underline{y}]_{B'} \\
&= P [\underline{y}]_{B'}
\end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
P &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \\
&= \left[ \left[ \underline{u}'_1 \right]_B, \left[ \underline{u}'_2 \right]_B, \dots, \left[ \underline{u}'_n \right]_B \right]
\end{aligned}$$

▲

**ตัวอย่าง 4.17** กำหนดปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^2$  มี  $B = \{u_1, u_2\}$  และ  $B' = \{u'_1, u'_2\}$  เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^2$

โดยที่  $u_1 = (1, 0), u_2 = (0, 1), u'_1 = (1, 1), u'_2 = (2, 1)$

จงหา 1) เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B'$  ไป  $B$

2)  $[\underline{y}]_B$  เมื่อ  $[\underline{y}]_{B'} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$  โดยใช้เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะ

**วิธีทำ** 1) เพราะว่า  $(1, 1) = 1(1, 0) + 1(0, 1)$

หรือ  $u'_1 = u_1 + u_2$

ดังนั้น  $\left[ \underline{u}'_1 \right]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

และเพราะว่า  $(2, 1) = 2(1, 0) + (0, 1)$

$$\text{หรือ} \quad \underline{u}_2' = 2\underline{u}_1 + \underline{u}_2$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \left[ \underline{u}_2' \right]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{ฉะนั้น เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก } B' \text{ ไป } B \text{ ไป } {}_{B'}A_B = \left[ \underline{u}_1' \right]_B, \left[ \underline{u}_2' \right]_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2) \text{ ให้ } \left[ \underline{v}_2 \right]_{B'} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{จาก } \left[ \underline{v} \right]_B = {}_{B'}A_B \left[ \underline{v} \right]_{B'}$$

$$\text{จะได้ } \left[ \underline{v} \right]_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

▲

จากตัวอย่าง 4.17 ข้อ 2) เราสามารถที่จะหา  $\left[ \underline{v} \right]_B$  ได้โดยตรง ดังนี้

$$\begin{aligned} \underline{v} &= -3\underline{u}_1' + 5\underline{u}_2' \\ &= -3(1,1) + 5(2,1) \\ &= (7,2) \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \left[ \underline{v} \right]_B = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

นอกจากนี้ เราสามารถหาเมทริกซ์พิกัดของสมาชิกในฐานหลักเก่า  $\underline{u}_1$  และ  $\underline{u}_2$  เทียบกับฐานหลักใหม่ได้ ดังนี้

$$\text{เนื่องจาก } (1,0) = -(1,1) + (2,1)$$

$$\text{หรือ} \quad \underline{u}_1 = -\underline{u}_1' + \underline{u}_2'$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \left[ \underline{u}_1 \right]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{และเพราะว่า } (0,1) = 2(1,1) - (2,1)$$

$$\text{หรือ} \quad \underline{u}_2 = 2\underline{u}_1' - \underline{u}_2'$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \left[ \underline{u}_2 \right]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{ฉะนั้น เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก } B \text{ ไป } B' \text{ คือ } {}_B A_{B'} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

โดยเมื่อนำเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B'$  ไป  $B$  มาคูณกับเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B$  ไป  $B'$

จะได้เมทริกซ์เอกลักษณ์

$${}_B A_B {}_B A_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_n$$

นั่นคือ  ${}_B A_{B'} = {}_B A_B^{-1}$

**ตัวอย่าง 4.18** ให้  $B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$  และ  $B' = \{(1,1,0), (0,1,1), (1,0,1)\}$  เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์  $\mathbb{R}^3$  จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B$  ไป  $B'$

**วิธีทำ** เพราะว่า  $(1,0,0) = \frac{1}{2}(1,1,0) - \frac{1}{2}(0,1,1) + \frac{1}{2}(1,0,1)$

ดังนั้น 
$$[(1,0,0)]_{B'} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

เพราะว่า  $(0,1,0) = \frac{1}{2}(1,1,0) + \frac{1}{2}(0,1,1) - \frac{1}{2}(1,0,1)$

ดังนั้น 
$$[(0,1,0)]_{B'} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

เพราะว่า  $(0,0,1) = -\frac{1}{2}(1,1,0) + \frac{1}{2}(0,1,1) + \frac{1}{2}(1,0,1)$

ดังนั้น 
$$[(0,0,1)]_{B'} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

ฉะนั้น เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B$  ไป  $B'$  คือ

$${}_B A_{B'} = \left[ [(1,0,0)]_{B'}, [(0,1,0)]_{B'}, [(0,0,1)]_{B'} \right] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \blacktriangle$$



ทฤษฎีบท 4.11 ให้  $P$  เป็นเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจากฐานหลัก  $B'$  ไปฐานหลัก  $B$  แล้ว

1.  $P$  จะมีตัวผกผัน  $P^{-1}$
2.  $P^{-1}$  เป็นเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจากฐานหลัก  $B$  ไป  $B'$

พิสูจน์ ให้  $Q$  เป็นเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B$  ไป  $B'$

จะแสดงว่า  $PQ = I_n$

ให้  $B = \{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_n\}$  และ  $\underline{x}$  เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ในปริภูมิเวกเตอร์  $V$

$$\text{สมมติ } PQ = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\text{จะได้ } [\underline{x}]_B = P[\underline{x}]_{B'}$$

$$\text{และ } [\underline{x}]_{B'} = Q[\underline{x}]_B$$

$$\text{นั่นคือ } P[\underline{x}]_{B'} = PQ[\underline{x}]_B$$

$$\text{หรือ } [\underline{x}]_B = PQ[\underline{x}]_B$$

$$\text{ให้ } \underline{x} = \underline{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{ดังนั้น } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{หรือ } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{bmatrix}$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้าให้  $\underline{x}$  แทนด้วย  $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_n$  จะได้

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \\ & \vdots \\ & \begin{bmatrix} c_{1n} \\ c_{2n} \\ \vdots \\ c_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \\ \text{นั่นคือ } PQ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I_n \end{aligned}$$

สรุปได้ว่า  $Q = P^{-1}$



**ตัวอย่าง 4.19** กำหนดปริภูมิเวกเตอร์  $P_2$  และกำหนดฐานหลัก  $B_1$  และ  $B_2$  ของ  $P_2$  ดังนี้

$$B_1 = \{\underline{p}_1, \underline{p}_2, \underline{p}_3\} \text{ โดย } \underline{p}_1 = x^2 + x + 1, \underline{p}_2 = x^2 + 2x + 3, \underline{p}_3 = x^2 + 1$$

$$B_2 = \{\underline{q}_1, \underline{q}_2, \underline{q}_3\} \text{ โดย } \underline{q}_1 = x + 1, \underline{q}_2 = x^2, \underline{q}_3 = x^2 + 1$$

- 1) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B_1$  ไป  $B_2$
- 2) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B_2$  ไป  $B_1$

**วิธีทำ** 1) เนื่องจาก

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} R_1 &\leftrightarrow R_2 \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_3 &\rightarrow R_3 - R_1 \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 &\rightarrow R_2 - R_3 \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

ดังนั้น เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B_1$  ไป  $B_2$  คือ

$${}_{B_1}A_{B_2} = \left[ \left[ \underline{p}_1 \right]_{B_2}, \left[ \underline{p}_2 \right]_{B_2}, \left[ \underline{p}_3 \right]_{B_2} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2) เนื่องจาก


$$\begin{aligned} & \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ \sim \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \\ \sim \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2 \end{array} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{l} R_3 \rightarrow \frac{R_3}{2} \\ \sim \end{array} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3 \\ \sim \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3 \end{array} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

ดังนั้น เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B_2$  ไป  $B_1$  คือ

$${}_{B_2}A_{B_1} = \left[ \left[ \underline{q}_1 \right]_{B_1}, \left[ \underline{q}_2 \right]_{B_1}, \left[ \underline{q}_3 \right]_{B_1} \right] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad \blacktriangle$$

นอกจากนี้ การเปลี่ยนฐานหลักสามารถนำมาประยุกต์กับการหมุนแกนได้อีกด้วย ซึ่งในหลาย ๆ ปัญหาของระบบพิกัดฉาก  $xy$  จะสามารถเปลี่ยนเป็นให้อยู่ในระบบพิกัดฉาก  $x'y'$  ได้โดยการหมุนแกน ทวนเข็มนาฬิกาที่จุดกำเนิดด้วยมุม  $\theta$  เมื่อทำสำเร็จได้จุด  $Q$  ใหม่ มีพิกัดเทียบกับระนาบ  $xy$  และ ระนาบ  $x'y'$  โดยอาศัยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมาตรฐาน (Standard Unit Vector) เข้ามาช่วย ทั้งนี้นิยามของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมาตรฐาน คือ เวกเตอร์ซึ่งมีขนาดหนึ่งหน่วย ในระนาบพิกัดฉากนิยามให้  $\underline{i} = (1, 0)$  และ  $\underline{j} = (0, 1)$  แทนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน  $x$  และ  $y$  ทางบวก ตามลำดับ และให้  $\underline{u}'_1$  และ  $\underline{u}'_2$  เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมาตรฐานตามแกน  $x'$  และ  $y'$  ทางบวก ตามลำดับ เราเทียบ


การหมุนเท่ากับการเปลี่ยนฐานหลักเก่า  $B = \{\underline{u}_1, \underline{u}_2\}$  และฐานหลักใหม่  $B' = \{\underline{u}'_1, \underline{u}'_2\}$  ดังรูป



โดยจะได้ความสัมพันธ์ว่า  $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$


ซึ่ง  $P$  เป็นเมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก  $B'$  ไป  $B$  สามารถหาได้จากเมทริกซ์พิกัดของฐานหลักใหม่  $\underline{u}'_1$  และ  $\underline{u}'_2$  เทียบกับฐานหลักเก่า มีหลักการดังนี้

กำหนดให้ส่วนประกอบของ  $\underline{u}'_1$  เทียบกับฐานหลักเก่าเป็น  $\cos \theta$  และ  $\sin \theta$   
 กล่าวคือ  $\begin{bmatrix} \underline{u}'_1 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$  ดังรูป



$$\begin{bmatrix} \underline{u}'_1 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

$$\text{และ } \begin{bmatrix} u_2' \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} \text{ ดังรูป}$$



ดังนั้น เมทริกซ์เปลี่ยนสถานะจาก \$B'\$ ไป \$B\$ คือ

$$P = {}_{B'} A_B = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

โดยมีตัวผกผันของ \$P\$ คือ

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\text{นั่นคือ } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{หรือ } x' = x \cos\theta + y \sin\theta$$

$$\text{และ } y' = -x \sin\theta + y \cos\theta$$

ตัวอย่างเช่น ถ้าให้หมุนแกนไปเป็นมุม \$\theta = 45^\circ\$

$$\text{จะได้ว่า } \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{และ } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ถ้าพิกัดเก่าของจุด  $Q$  คือ  $(x, y) = (2, -1)$

$$\text{แล้ว } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{3}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad \text{นั่นคือ พิกัดใหม่ของ } Q \text{ คือ}$$

$$(x', y') = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{\sqrt{2}} \right)$$

#### แบบฝึกหัดบทที่ 4

1. จงพิจารณาว่า เซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$

1.1  $\{(1, 0, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 3)\}$       1.2  $\{(3, 1, -4), (2, 5, 6), (1, 4, 8)\}$

1.3  $\{(2, -1, 1), (4, 1, 1), (0, -7, 1)\}$       1.4  $\{(1, 6, 4), (2, 4, -1), (-1, 2, 5)\}$

2. จงพิจารณาว่า เซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นฐานหลักของ  $P_2$

2.1  $\{1-3x+2x^2, 1+x+4x^2, 1-7x\}$

2.2  $\{4+6x+x^2, -1+4x+2x^2, 5-2x-x^2\}$

2.3  $\{1+x+x^2, x+x^2, x^2\}$

3. ในปริภูมิเวกเตอร์  $M_{2 \times 2}$  ให้  $S = \left\{ \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \right\}$

จงพิสูจน์ว่า  $S$  เป็นฐานหลักของ  $M_{2 \times 2}$

4. จงหาฐานหลักของ  $\mathbb{R}^3$  โดยที่ฐานหลักนี้มีเวกเตอร์ที่กำหนดเป็นสมาชิก

4.1  $v = (1, 0, 1)$

4.2  $v_1 = (2, 3, -1), v_2 = (4, -2, 1)$

5. จงหาฐานหลักและมิติของปริภูมิของผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธ์ต่อไปนี้

5.1  $x_1 + x_2 - x_3 = 0$

5.2  $3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$

$-2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$

$5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$

$-x_1 + x_3 = 0$

$$5.3 \quad \begin{aligned} x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 &= 0 \\ 2x_1 - 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.4 \quad \begin{aligned} x_1 - 3x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 3x_1 - 9x_2 + 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.5 \quad \begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 0 \\ x_1 + 5x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.6 \quad \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 &= 0 \\ 6x_1 + 5x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.7 \quad \begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 8x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.8 \quad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 7x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.9 \quad \begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.10 \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 - x_5 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 7x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.11 \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 - 4x_5 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 - x_4 + 5x_5 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 2x_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.12 \quad \begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.13 \quad \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.14 \quad \begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 8x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.15 \quad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 7x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$5.16 \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 - x_5 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 7x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

6. จงหาฐานหลักของเซตของผลเฉลยซึ่งเป็นปริภูมิย่อยของ  $\mathbb{R}^3$  ที่กำหนด

6.1 ระนาบ  $3x - 2y + 5z = 0$

6.2 เส้นตรง  $x = 2t, y = -1, z = 4t$

7. กำหนด  $V$  เป็นปริภูมิย่อยของ  $\mathbb{R}^4$  จงหามิติของ  $V$  ที่กำหนด

7.1  $V = \{(a, b, c, 0) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

7.2  $V = \{(a, b, c, d) \mid d = a + b, c = a - b\}$

7.3  $V = \{(a, b, c, d, e) \mid a = c = e\}$

8. จงหาเมทริกซ์พิกัดและเวกเตอร์พิกัดของ  $\underline{v}$  เทียบกับฐานหลัก  $S = \{v_1, v_2\}$

8.1  $v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1), v = (3, -7)$

8.2  $v_1 = (2, -4), v_2 = (3, 8), v = (1, 1)$

8.3  $v_1 = (1, 1), v_2 = (0, 2), v = (a, b)$

9. จงหาเวกเตอร์พิกัดและเมทริกซ์พิกัดของ  $\underline{v}$  เทียบกับ  $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  เมื่อ

$$\underline{v} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, v_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

#### ผลเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4

1. 1.1, 1.2, 1.3

2. 2.2, 2.3

4. 4.1  $\{(1, 0, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$

4.2  $\{(2, 3, -1), (4, -2, 1), (1, 0, 0)\}$

5. 5.1 ฐานหลัก =  $(1, 0, 1)$ ; มิติ = 1

5.2 ฐานหลัก =  $(1, 0, -1/2, 0), (0, 1, 1/2, 1)$ ; มิติ = 2

5.3 ฐานหลัก =  $(4, 1, 0, 0), (-3, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1)$ ; มิติ = 3

5.4 ฐานหลัก =  $(3, 1, 0), (-1, 0, 1)$ ; มิติ = 2

5.5 ไม่มีฐานหลัก; มิติ = 0

5.6 ฐานหลัก =  $(4, -5, 1)$ ; มิติ = 1

5.7 ฐานหลัก =  $(7, -1, -2)$ ; มิติ = 1

5.8 ไม่มีฐานหลัก; มิติ = 0

5.9 ฐานหลัก =  $(18, -1, -7)$ ; มิติ = 1

5.10 ฐานหลัก =  $(2, -1, 0, 0, 0), (4, 0, 1, -1, 0), (3, 0, 1, 0, 1)$ ; มิติ = 3

5.11 ฐานหลัก =  $(2, -1, 0, 0, 0), (1, 0, 1, 0, 0)$ ; มิติ = 2

5.12 ฐานหลัก =  $(-1, 1, 0, 0, 0), (-1, 0, -1, 0, 1)$ ; มิติ = 2

5.13 ฐานหลัก =  $(-1, -1, 1)$ ; มิติ = 1



5.14 ฐานหลัก =  $(-7/2, 1/2, 1)$ ; มิติ = 1

5.15 ไม่ฐานหลัก; มิติ = 0

5.16 ฐานหลัก =  $(-2, 1, 0, 0, 0), (-4, 0, -1, 1, 0), (3, 0, 1, 0, 1)$ ; มิติ = 3

6. 6.1  $(1, 0, -3/5), (0, 1, 2/5)$  หรือ  $(2/3, 1, 0), (-5/3, 0, 1)$  หรือ  $(1, 3/2, 0), (0, 5/2, 1)$

7. 7.1 มิติ = 3

7.2 มิติ = 2

7.3 มิติ = 3

$$8. \quad 8.1 \quad (\underline{v})_s = (3, 7), [\underline{v}]_s = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix} \qquad 8.2 \quad (\underline{v})_s = \left( \frac{5}{28}, \frac{3}{14} \right), [\underline{v}]_s = \begin{bmatrix} \frac{5}{28} \\ \frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

$$8.3 \quad (\underline{v})_s = \left( a, \frac{b-a}{2} \right), [\underline{v}]_s = \begin{bmatrix} a \\ \frac{b-a}{2} \end{bmatrix}$$

$$9. \quad (\underline{v})_s = (-1, 1, -1, 3), [\underline{v}]_s = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$



