

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 การนำสถิติไปใช้ในงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวข้องกับสถิติเสมออย่างไม่รู้ตัว เรามักจะได้ยินการพูดถึงสถิติในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น ประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นมาก หรือในช่วงหยุดเทศกาลต่าง ๆ ก็มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เมื่อคูกีฬา ก็มีการเปรียบเทียบกับสถิติที่ผ่านมาว่ามีการทำลายสถิติหรือไม่ คำว่าสถิติจึงคุ้นหูเราอยู่เสมอ ขอบเขตของคำว่า "สถิติ" มีความหมายกว้างขวางมาก โดยสถิติเป็นศาสตร์เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกคน เพราะการดำรงชีวิตของเราอยู่ที่การเปรียบเทียบ การวัด การประมาณค่าตลอดจนการนำตัวเลขมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ อีกทั้งสถิติยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้สรุปผลการทดลองต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเมื่อมีการผลิตขึ้นมาแล้วต้องมีการทดลอง การสรุปผลการทดลองต้องใช้ศาสตร์ทางด้านสถิตินั่นก็คือการทดสอบสมมติฐานในการสรุปผล หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา เคมี การทดลองต่างๆเมื่อจะทำการทดลองก็ต้องใช้สถิติในเรื่องของการวางแผนการทดลองไปใช้ เมื่อจะสรุปผลการทดลองก็ต้องใช้ศาสตร์ทางสถิตินั่นก็คือการทดสอบสมมติฐานในการสรุปผลอีกเช่นเดียวกัน หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หากมีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือออกแบบโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมไปทดลองใช้การสรุปผลก็ต้องใช้สถิติเข้าไปช่วยในการสรุปผลอีกด้วย เป็นต้น

### 1.2 ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลสามารถแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ข้อมูลจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่ง เช่น

#### 1.2.1 แบ่งตามแหล่งที่มา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.2.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลโดยตรง อาจจะได้โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การวัด การนับ หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์

1.2.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมโดยการคัดลอกจากเอกสาร รายงานต่างๆที่มีผู้อื่นจัดทำไว้ เช่น ข้อมูลจากงานทะเบียน ทะเบียนสะสม รายงานประจำปี สารานุกรม เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น

### 1.2.2 แบ่งตามลักษณะของข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.2.2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข เช่น ส่วนสูงของต้นพืช ค่า BOD ที่วัดได้จากแหล่งน้ำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลังการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

1.2.2.2 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลขแต่จะแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้น เช่น ความคิดเห็นที่อยู่ในลักษณะข้อความ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น

### 1.2.3 แบ่งตามสภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ คือ

1.2.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ชื่อสกุล อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ เป็นต้น

1.2.3.2 ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Data) คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัยที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่

1.2.3.3 ข้อมูลพฤติกรรม (Behavioral Data) คือข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง เช่น ระดับ IQ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจ เป็นต้น

## 1.3 มาตรการวัดข้อมูล

1.3.1 มาตรฐานนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นมาตรวัดที่ไม่มีค่าเฉลี่ย เป็นการแบ่งกลุ่มหรือจัดประเภทตามคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ เท่านั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1 แทน เพศชาย 2 แทน เพศหญิง ค่าที่ใส่กำหนดแต่ละกลุ่มจะไม่มีค่าความหมายในเชิงปริมาณ ไม่สามารถนำไปบวก ลบ คูณ หารกันได้ เช่น

$$\text{เพศ} = \begin{cases} 1 & \text{แทน เพศชาย} \\ 2 & \text{แทน เพศหญิง} \end{cases}$$

ข้อมูลมาตรารัดนี้ จะสามารถหาค่าความถี่กับร้อยละได้ แต่ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังสามารถนำความถี่มาหาค่าฐานนิยม การทดสอบไคสแควร์ และ การทดสอบทวินามได้

1.3.2 มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) เป็นมาตรวัดที่แบ่งกลุ่มตามลำดับความสำคัญ สามารถบอกได้ว่ากลุ่มใดดีกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ไม่สามารถบอกปริมาณความมากกว่าหรือน้อยกว่าว่าเป็นเท่าใด เช่น งานอดิเรกที่ชอบทำในวันหยุด โดยให้เรียงลำดับงานอดิเรกที่ชอบทำมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นอันดับ 2 ไปเรื่อยๆจนครบตามคำตอบที่กำหนดไว้ เช่น

	อันดับที่
● ปีนต้นไม้	5
● อ่านหนังสือ	2
● ดูทีวี	1
● เล่นกีฬา	3
● ฟังเพลง	4

จากตัวอย่างบอกได้เพียงว่าผู้ตอบ ชอบดูทีวีมากกว่าอ่านหนังสือ และ ชอบอ่านหนังสือมากกว่าเล่นกีฬา แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าชอบมากกว่ากันเท่าใด

ข้อมูลมาตรารัดนี้ จะสามารถหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และ การทดสอบไคสแควร์ได้

1.3.3 มาตราอันดับ (Interval Scale) เป็นมาตรวัดที่มีความละเอียด หน่วยการวัดคงที่สามารถระบุความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆได้ เป็นมาตรวัดที่มีความหมายเชิงปริมาณ แต่ไม่มีศูนย์ที่แท้จริง (true zero) ข้อมูลที่ได้จากการวัดระดับนี้ สามารถนำมาบวกลบกันได้ แต่ไม่สามารถนำมาคูณและหารกันได้ เช่น อุณหภูมิ  $0^{\circ}\text{C}$  เป็นจุดเยือกแข็ง ไม่ใช่ไม่มีอุณหภูมิอยู่ สำหรับข้อมูลที่วัดระดับความพึงพอใจที่เรียกว่า Likert scale ที่มีตั้งแต่ 5 ระดับขึ้นไปเราจะถือว่าอยู่ในมาตรารัดนี้ด้วย แต่จะต้องมีการให้หมายเลขที่มีระยะห่างเท่าๆกัน เช่น

มากที่สุด	แทนด้วย 5
มาก	แทนด้วย 4
ปานกลาง	แทนด้วย 3
น้อย	แทนด้วย 2
น้อยที่สุด	แทนด้วย 1

ข้อมูลมาตราการวัดนี้ จะสามารถหาค่าความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม การทดสอบไคสแควร์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้

1.3.4 มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นมาตรวัดในระดับที่มีความละเอียดมากที่สุดเท่าที่มีอยู่ มีศูนย์ที่แท้จริงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น เช่น นายมาดีมีเงิน 0 บาท แสดงว่า นายมาดีไม่มีเงินอยู่เลย สำหรับข้อมูลมาตราการวัดนี้ จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติได้เกือบทุกชนิด

## 1.4 ประเภทของสถิติ

สามารถแบ่งประเภทของสถิติออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1.4.1 สถิติพรรณนา เป็นสถิติที่เป็นการบรรยายลักษณะทั่วไปของข้อมูล ผลการวิเคราะห์จะใช้อธิบายเฉพาะกลุ่มที่นำมาศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปอ้างอิงถึงกลุ่มอื่นได้

1.4.2 สถิติเชิงอนุมาน เป็นเทคนิคที่นำข้อมูลเพียงบางส่วนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไปศึกษา และจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนี้ จะนำไปเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยการอ้างอิงด้วยเทคนิคทางสถิติ เช่น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นต้น

## 1.5 ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง

ในงานวิจัยต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านอื่นๆบางครั้งประชากรที่นำมาใช้มีจำนวนมากไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของประชากรได้ ดังนั้นจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การได้มาซึ่งตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรต้องอาศัยเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling)

### 1.5.1 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling)

#### 1.5.1.1 การสุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling)

การสุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยให้แต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกันทุกหน่วย สำหรับวิธีการเลือกตัวอย่างสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กัน เช่น ใช้วิธีการจับฉลาก ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับขนาดตัวอย่างไม่มากนักและการใช้ตารางเลขสุ่ม

#### 1.5.1.2 การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling)


การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ คือ การสุ่มตัวอย่างที่ทำการเลือกหน่วยตัวอย่างแรกแบบสุ่ม จากหน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่  $k$  โดยที่  $k = \frac{N}{n}$  และต่อจากนั้นจะเลือกหน่วยตัวอย่างต่อไปทุกๆ  $k$  หน่วย จนกระทั่งครบ  $n$  หน่วยตามที่ต้องการ กล่าวคือ ถ้าเลือกได้หน่วยตัวอย่างแรกเป็นหน่วยที่  $i$  เมื่อ  $1 \leq i \leq k$  หน่วยตัวอย่างที่จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างคือ หน่วยตัวอย่างที่  $i, i+k, i+2k, i+3k, \dots, i+(n-1)k$

เช่น สมมติว่าถ้า  $k = 20$  และเลือกได้หน่วยตัวอย่างแรกเป็นหน่วยที่ 9 ดังนั้นตัวอย่างที่จะถูกเลือกต่อไปคือ หน่วยที่ 29, 49, 69, 89, ..... ฯลฯ จนกระทั่งครบ  $n$  หน่วย การสุ่มตัวอย่างดังกล่าวอาจถูกเรียกว่าเป็น การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบทุกๆ  $k$  หน่วย

#### 1.5.1.3 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เป็นการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่มีการแบ่งออกเป็นชั้นภูมิ (stratum) ตามลักษณะบางอย่าง แล้วเลือกตัวแทนของประชากรในแต่ละชั้นภูมิขึ้นมาจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นตัวอย่างในการสำรวจ วิธีการแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิ เรียกว่า stratification แต่ละชั้นภูมิของประชากรที่แบ่งออกไปเรียกว่า stratum หลักสำคัญในการแบ่งก็คือให้หน่วยที่อยู่ในชั้นภูมิเดียวกันควรมีความคล้ายคลึงกัน (homogeneity within stratum) มากที่สุด แต่มีความแตกต่างกันระหว่างชั้นภูมิมากที่สุด (heterogeneity between stratum)

เช่น



จากรูป เป็นการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 ชั้นภูมิ คือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งภายในแต่ละชั้นภูมิจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่ในระหว่างกลุ่ม อาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ และกลุ่มนักศึกษามีความแตกต่างกัน

#### 1.5.1.4 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster randoms sampling)

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยที่ประชากรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ (Cluster) โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะภายในกลุ่มที่หลากหลายหรือมีความแตกต่าง แต่ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน กลุ่มนักเรียนในห้องเรียน เป็นต้น จำนวนของกลุ่มต่าง ๆ จะถูกสุ่มขึ้นมา ทำการศึกษา เมื่อสุ่มได้กลุ่มใดก็จะนำสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนั้น ๆ ทั้งหมดมาทำการศึกษา เช่น การศึกษาเกี่ยวกับครัวเรือนในประเทศไทย เราอาจแบ่งครัวเรือนออกเป็นกลุ่มโดยใช้ตำบลเป็นหลัก แล้วทำการสุ่มตำบล เมื่อสุ่มตำบลแล้ว ก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนที่อยู่ในตำบลที่สุ่มได้นั้น ๆ

#### 1.5.2 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling)

การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมกับกรณีที่ไม่มีการรอบตัวอย่างหรือในกรณีที่กรอบตัวอย่างไม่สมบูรณ์ ข้อมูลมีการกระจายมาก ต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่นิยมใช้จะมีอยู่ 3 วิธีคือ

#### 1.5.2.1 การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)

เป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกของผู้จัดเก็บข้อมูล เช่น โทรศัพท์ถามความเห็น การออกจดหมายส่งแบบสอบถาม เป็นต้น โดยการสุ่มตัวอย่างชนิดนี้จะไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรที่สนใจได้

#### 1.5.2.2 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ (Judgment Sampling)

เป็นการเลือกตัวอย่างโดยตัดสินใจว่าจะเลือกตัวอย่างใดเป็นตัวแทนของประชากร โดยเจาะจงหน่วยตัวอย่างที่จะเลือกไว้แล้ว เช่น กำหนดเกณฑ์การศึกษากลุ่ม โดยคัดเลือกดูจากขนาดครอบครัว รายได้ ฯลฯ สำหรับการเลือกตัวอย่างแบบนี้ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีการวางแผนเป็นอย่างดีในการเลือกตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวแทนประชากร ถึงแม้ว่าการสุ่มตัวอย่างแบบนี้จะไม่สามารถบอกถึงระดับความผิดพลาดได้อย่างแน่ชัด แต่จะให้ผลดีกว่าการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก

#### 1.5.2.3 การสุ่มตัวอย่างโดยการกำหนดโควตา (Quota Sampling)

การสุ่มตัวอย่างโดยการกำหนดโควตา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวน ในการสุ่มแบบนี้ ประชากรจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่เลือกเอาไว้เป็นเพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ โดยกำหนดสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม เช่น จะศึกษาประชากร 300 คน ก็ให้ประมาณว่าจะใช้เพศชาย เพศหญิงอย่างละกึ่งคน ระดับการศึกษา อายุ รายได้ จำนวนกลุ่มละเท่าไร การจัดสัดส่วนระหว่างกลุ่มพยายามให้มีเท่ากันในแต่ละกลุ่ม แล้วจึงลงมือเก็บข้อมูลแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) คือเก็บเฉพาะคนที่ให้ความร่วมมือจนครบจำนวนตามต้องการ โดยข้อจำกัดของการสุ่มแบบนี้คือ ผู้วิจัยจะไม่ทราบสัดส่วนที่แน่นอนของผู้ตอบแต่ละกลุ่ม และการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก

### 1.6 การกำหนดขนาดตัวอย่าง

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจด้วยตัวอย่าง ปัญหาที่พบเสมอก็คือ ควรจะใช้ขนาดตัวอย่างเท่าไร โดยทั่วไปหากใช้ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จะทำให้การประมาณค่าหรือการทดสอบสมมติฐานมีความแม่นยำ แต่ในทางปฏิบัติจะมีข้อจำกัดในการกำหนดขนาดตัวอย่าง เช่น ระยะเวลา งบประมาณ เป็นต้น

สำหรับวิธีกำหนดขนาดตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การใช้ตารางกำหนดขนาดตัวอย่าง และ ประเภทที่ 2 การคำนวณโดยใช้สูตร

**1.6.1 การใช้ตารางกำหนดขนาดตัวอย่าง ที่นิยมใช้ ตารางของทาโร ยามานะ (Taro Yamane) และ ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (R. V. Krejcie and D.W. Morgan) ตัวอย่างตารางของทาโร ยามานะ**

ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่างตามความคลาดเคลื่อน					
	±1%	±2%	±3%	±4%	±5%	±10%
500	-	-	-	-	222	83
1,000	-	-	-	385	286	91
1,500	-	-	638	441	361	94
2,000	-	-	718	476	333	95
2,500	-	1,250	769	500	345	96
3,000	-	1,364	811	517	353	97
3,500	-	1,458	843	530	359	97
4,000	-	1,538	870	541	364	98
4,500	-	1,607	891	549	367	98
5,000	-	1,667	909	556	370	98
6,000	-	1,765	938	566	375	98
7,000	-	1,842	959	574	378	98
8,000	-	1,905	976	580	381	99
9,000	-	1,957	989	584	383	99
10,000	5,000	2,000	1,000	588	385	99
15,000	6,000	2,143	1,034	600	390	99
20,000	6,667	2,222	1,053	606	392	100
25,000	7,143	2,273	1,064	610	394	100
50,000	8,333	2,381	1,087	617	397	100
100,000	9,091	2,439	1,099	621	398	100
>100,000	10,000	2,500	1,111	625	400	100



ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ขนาด ประชากร	ขนาดตัวอย่างตามความคลาดเคลื่อน				
	±1%	±2%	±3%	±4%	±5%
500	-	-	-	-	-
1,000	-	-	-	-	474
1,500	-	-	-	726	563
2,000	-	-	-	826	621
2,500	-	-	-	900	622
3,000	-	-	1364	958	692
3,500	-	-	1458	1003	716
4,000	-	-	1539	1041	735
4,500	-	-	1607	1071	750
5,000	-	-	1667	1098	763
6,000	-	2903	1765	1139	783
7,000	-	3119	1842	1171	798
8,000	-	3303	1905	1196	809
9,000	-	3462	1957	1216	818
10,000	-	3600	2000	1233	826
15,000	-	4091	2143	1286	849
20,000	-	4390	2222	1314	861
25,000	11842	4592	2273	1331	869
50,000	15517	5056	2381	1368	884
100,000	18367	5325	2439	1387	892
>100,000	22500	5625	2500	1406	900

### ตัวอย่าง

ถ้าจำนวนประชากร 2,500 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ 3% จะใช้จำนวนตัวอย่างเพื่อการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 769 คน ในกรณีที่จำนวนของประชากรไม่มีในตารางอาจจะใช้การประมาณขนาดตัวอย่างโดยเลือกใช้นัด ประชากรที่มีจำนวนใกล้เคียงที่สุดหรือใช้วิธีเปรียบเทียบสัดส่วน

ตัวอย่างตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของเครื่องใช้และมอเตอร์แกน

ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่าง	ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่าง	ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่าง
10	10	220	140	1,200	291
15	14	230	144	1,300	297
20	19	240	148	1,400	302
25	24	250	152	1,500	306
30	28	260	155	1,600	310
35	32	270	159	1,700	313
40	36	280	162	1,800	317
45	40	290	165	1,900	320
50	44	300	169	2,000	322
55	48	320	175	2,200	327
60	52	340	181	2,400	331
65	56	360	186	2,600	335
70	59	380	191	2,800	338
75	63	400	196	3,000	341
80	66	420	201	3,500	345
85	70	440	205	4,000	351
90	73	460	210	4,500	354
95	76	480	214	5,000	357
100	80	500	217	6,000	361
110	86	550	226	7,000	364
120	92	600	234	8,000	367
130	97	650	242	9,000	368
140	103	700	248	10,000	370
150	108	750	254	15,000	375
160	113	800	260	20,000	377
170	118	850	265	30,000	378
180	123	900	269	40,000	380
190	127	950	274	50,000	381
200	132	1,000	278	75,000	382
210	136	1,100	285	100,000	384

**1.6.2 การคำนวณจำนวนของตัวอย่างโดยใช้สูตร**

ซึ่งมีหลายสูตร แต่ละสูตรมีเงื่อนไขแตกต่างกัน เช่น พารามิเตอร์ที่ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์ ขนาดประชากร ความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าพารามิเตอร์กับ ค่าสถิติ ระดับความเชื่อมั่น ระดับนัยสำคัญ เป็นต้น โดยในบทนี้จะขอกกล่าวเพียงวิธีที่นิยมใช้ 4 วิธี ดังนี้

1.6.2.1 เมื่อทราบจำนวนของประชากรและผู้วิจัยกำหนดความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าพารามิเตอร์กับค่าสถิติคำนวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

จากสูตร 
$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

เมื่อ  $n$  เป็น จำนวนของตัวอย่าง

$N$  เป็น จำนวนของประชากร

$e$  เป็น สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนเทียบกับค่าพารามิเตอร์

ตัวอย่าง ถ้าในงานวิจัยมีจำนวนประชากร 4,000 คน ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ 5% จะใช้จำนวนตัวอย่างเพื่อการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ

วิธีทำ จากสูตร 
$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{4,000}{1 + 4,000(0.05)^2} \\ &= 363.63 \approx 364 \text{ คน} \end{aligned}$$

1.6.2.2 เมื่อทราบจำนวนของประชากรและสัดส่วนตามลักษณะที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา จากกลุ่มประชากรกำหนดความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าพารามิเตอร์กับค่าสถิติและระดับความเชื่อมั่น คำนวณโดยใช้สูตรของเกรจซีและมอร์แกน

จากสูตร 
$$n = \frac{\chi^2 N p (1 - p)}{e^2 (N - 1) + \chi^2 p (1 - p)}$$

เมื่อ  $n$  เป็นจำนวนของตัวอย่าง

$N$  เป็นจำนวนของประชากร

$e$  เป็นสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนเทียบกับค่าพารามิเตอร์

$p$  เป็นสัดส่วนตามลักษณะที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาจากกลุ่มประชากร

$\chi^2$  เป็นค่าไคสแควร์ (Chi - Square) ที่องศาความเป็นอิสระเท่ากับ 1

และระดับความเชื่อมั่น  $(1 - \alpha)100\%$

ตัวอย่าง ในการศึกษาภาวะการณืเป็นผู้นำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีอาจารย์จำนวน 600 คน โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด ถ้าร้อยละ 50 ของคนทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอาจารย์

วิธีทำ จากสูตร 
$$n = \frac{\chi^2 N p (1-p)}{e^2 (N-1) + \chi^2 p (1-p)}$$

จะได้  $N = 600$  ,  $e = 0.05$  ,  $p = 0.5$  และ  $\chi^2_{1,0.05} = 3.841$

ทำให้ 
$$n = \frac{3.841 \times 600 \times 0.5 \times 0.5}{0.05^2 (600 - 1) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)} = 234.42$$

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จะต้องใช้ขนาดตัวอย่าง 235 ตัวอย่าง

1.6.2.3 ต้องการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของประชากร โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน  $e$  และระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  หรือที่ระดับความเชื่อมั่น  $(1 - \alpha)100\%$  สำหรับการวิเคราะห์สองด้าน

จากสูตร 
$$n = \left( \frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2$$

เมื่อ  $n$  เป็นจำนวนของตัวอย่าง

$Z_{\alpha/2}$  เป็นค่าปกติมาตรฐานที่  $P(Z \geq Z_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$

$\sigma$  เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

$e$  เป็นค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างถ้าไม่ทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรให้ประมาณด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่าง นักจิตวิทยาผู้หนึ่งตรวจพบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเป็น 0.07 วินาที จะต้องใช้จำนวนตัวอย่างเท่าใดเพื่อทำให้มีความเชื่อมั่น 99% และมีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน 0.02 วินาที

วิธีทำ จากโจทย์ทราบว่า  $\sigma = 0.07$  ,  $e = 0.02$  และ  $Z_{\alpha/2} = Z_{0.005} = 2.576$

$$\begin{aligned} \text{จากสูตร} \quad n &= \left( \frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2 \\ n &= \left( \frac{2.576(0.07)}{0.02} \right)^2 = 81.29 \end{aligned}$$

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 99% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.02 วินาที จะต้องใช้ขนาดตัวอย่าง 81 ตัวอย่าง

1.6.2.4 ต้องการวิเคราะห์สัดส่วนของประชากร โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนระหว่าง สัดส่วนของประชากรกับสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน  $e$  และระดับนัยสำคัญ  $\alpha$  สำหรับการ วิเคราะห์สองด้าน

$$\text{จากสูตร} \quad n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \hat{p}\hat{q}}{e^2}$$

เมื่อ  $n$  เป็นจำนวนของตัวอย่าง

$$Z_{\alpha/2} \text{ เป็นค่าปกติมาตรฐานที่ } P(Z \geq Z_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$$

$\hat{p}$  เป็นสัดส่วนลักษณะที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

$\hat{q}$  เป็นสัดส่วนลักษณะที่ไม่ได้ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง  $\hat{q} = 1 - \hat{p}$

$e$  เป็นค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างสัดส่วนของประชากรกับสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่าง ต้องการประมาณสัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ วิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง ให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 15% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ควรสุ่ม ตัวอย่างจำนวนเท่าใด จากข้อมูลเก่าทราบว่า มีร้อยละ 45 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์

วิธีทำ จากโจทย์จะได้  $e = 0.15$ ,  $\hat{p} = 0.45$ , และ  $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$

$$\begin{aligned} \text{จากสูตร} \quad n &= \frac{Z_{\alpha/2}^2 \hat{p}\hat{q}}{e^2} \\ &= \frac{1.96^2 \times 0.45 \times 0.55}{0.15^2} \\ &= 42.26 \end{aligned}$$

ดังนั้น การประมาณสัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์  
วิทยาศาสตร์ควรสุ่มสอบถามจากประชาชน 42 คน

## 1.7 บทสรุป

สถิติเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกคน เพราะการดำรงชีวิตของเราอยู่ที่การเปรียบเทียบ  
การวัด การประมาณค่าตลอดจนการนำตัวเลขมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ อีกทั้งสถิติยังเป็น  
เครื่องมือที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้สรุปผลการทดลองต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย  
โดยการที่จะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างมีคุณภาพนั้นผู้วิเคราะห์ควรต้องทราบก่อนว่าข้อมูลที่เรา  
นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลประเภทใด หรือเป็นข้อมูลชนิดใด และควรเลือกสุ่มขนาดตัวอย่าง  
มาใช้ในการวิเคราะห์เท่าใด เพื่อให้การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติแม่นยำมากขึ้น

## แบบฝึกหัดบทที่ 1

1. จากการสำรวจนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้ พบว่า ร้อยละ 35 มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้ โดยเป็นเพศชายร้อยละ 45 จากข้อความนี้เป็นตัวอย่างของสถิติพรรณนาหรือสถิติอนุมาน จงอธิบายโดยให้เหตุผลประกอบคำอธิบาย
2. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงบอกชนิดของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือข้อมูลเชิงปริมาณ
  - ก. ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่ตรวจพบในเลือด 1 หยด
  - ข. การงอกของต้นพืชในแปลงทดลอง
  - ค. สาเหตุการตายของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
  - ง. ส่วนสูงและน้ำหนักของสุกรที่บริโภคน้ำอาหารต่างชนิดกัน
  - จ. จำนวนชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดที่ผลิตจากโรงงานแห่งหนึ่ง
3. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงบอกชนิดของมาตราการวัดข้อมูล
  - ก. อุณหภูมิในร่างกายของผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัด
  - ข. ระยะการป่วยของโรคมะเร็ง
  - ค. ปริมาณสังกะสีที่ตรวจพบจากน้ำที่เก็บมาจากแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง
  - ง. ชนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  - จ. ปริมาณน้ำตาลในเลือดที่ลดลงเมื่อบริโภคน้ำสมุนไพรต่างชนิดกัน
4. นักวิจัยท่านหนึ่งต้องการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จากงานวิจัยนี้จึงบอก ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องใช้ในงานวิจัยนี้
5. นักวิจัยท่านหนึ่งต้องการประมาณสัดส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ควรสุ่มตัวอย่างมาจำนวนเท่าใด โดยจากข้อมูลเก่าทราบว่ามียุติบัตร 30 ของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
6. จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ้านักวิจัยต้องการให้ข้อมูลมีความเชื่อมั่น 95 % โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า ไม่เกิน 0.02 คะแนน ถ้าพบว่าในเรื่องนี้มีผู้เคยสำรวจในลักษณะดังกล่าวแล้ว โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 60 คะแนน อยากทราบว่าต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด

7. ในการสำรวจสัดส่วนของผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยควรใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด ถ้าต้องการให้ความผิดพลาดระหว่างค่าประมาณกับค่าจริงไม่เกิน 7% ด้วยระดับความเชื่อมั่น 90% โดยจากข้อมูลย้อนหลังทราบว่าสัดส่วนของผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่ผ่านมา เท่ากับ 0.7
8. นักวิจัยท่านหนึ่งต้องการประมาณสัดส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งที่มีพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน ให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ควรสุ่มตัวอย่างมาจำนวนเท่าใด โดยจากข้อมูลเก่าทราบว่า มีร้อยละ 15 ของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน
9. ในการสุ่มตัวอย่าง ถ้าค่าสังเกตที่เราไปทำการสำรวจจากทุกหน่วยในประชากรมีลักษณะที่หลากหลายคละกันอยู่ ควรใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใด จงอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้
10. ถ้าในการสุ่มตัวอย่างไม่ทราบกรอบตัวอย่างควรเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใด
11. จงบอกข้อแตกต่างของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ